

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷二十三

雜病源流屏燭面部門

耳病源流

沈金鰲撰

耳屬足少陰腎之寄竅也。耳所致者精氣調和腎氣充足則耳聰。若勞傷氣血風邪乘虛使精脫腎憊則耳聾。是腎為耳聾之原也。宜益腎散六味丸肉蓯蓉丸然腎竅于耳所以聰聽。是因水生於金。蓋肺主氣一身之氣貫于耳。故能為聽。故凡治耳聾必先調氣。開鬱。昔人用磁石羊腎丸以開關竅者。以聾之為病多由痰火鬱結。非磁石鎮墜。烏桂椒辛。菖蒲辛散。以通利老痰。則鬱火何由而開。入門謂愈後以通聖散和之是也。雖然耳之聾正自有辨。左聾屬足少陽之火。其原起于忿怒。宜龍胆湯右聾屬足太陽之火。其原起于色慾。宜滋陰地黃丸左右俱聾屬足陽明之火。其原起于醇酒厚味。宜酒製通聖散清聽化痰。

九然三者之病由於忿怒者更多以肝胆之火易動也以上皆耳

聾之原也由是而耳之爲病有不可勝言者矣何言之五臟六腑

十二經脉有絡于耳者其陰陽經氣有時交併併則臟氣逆而厥

厥氣搏入耳是爲厥聾宜流氣散常歸龍薈丸耳爲宗脈所附脈虛而風邪

湊之風入于耳使經氣否而不宣是爲風聾必兼頭疼之症宜防風通

聖散若風虛宜桂香散若風熱宜開痰散皆從風聾例有勞役傷其血氣淫慾

耗其精元瘦瘁力疲昏昏憤憤是爲勞聾能將息使血氣和平則

其聾漸輕總之或因房勞精脫宜益腎散人參養榮湯加鹽炒知柏或因腎經素虛

宜燒散或因腎氣虛而久聾宜姜蠟散以開之皆當分治有大病後耳觸風

邪與氣相搏其聲嘈嘈而鳴眼見黑花謂之虛聾宜四物湯加鹽酒炒知柏腎氣

丸加磁石黃柏其勞役脫氣者別治宜補中益氣湯加知母黃柏其

由陰虛火動者別治宜六味丸加知母黃柏有雨水入耳浸漬腫

痛謂之聾宜涼風制芥或五苓散加陳皮枳壳紫蘇生姜

之法宜黃有腎氣虛風邪傳經絡因入于耳邪與正相薄而卒無

聞者謂之卒聾亦曰暴聾宜芎或由厥逆之氣如經云少陽

之厥暴聾者皆卒聾也須用塞耳法宜蒲黃膏而此六者之外又

有怒氣厥逆氣壅于上而聾者宜流氣散有氣寔而鳴且聾者宜

九有氣閉而忽聾者宜甘草湯再有肝胆火盛耳內蟬鳴漸至

于聾者宜聰耳有小兒即耳聾者腎竅通耳風邪乘三焦邪隨其

經入耳內邪正搏而氣停塞滯也宜通有腎熱耳聾者宜燒鐵投

以磁石塞耳日易夜去之有火風侵竅而耳鳴者宜驅風有暑邪竅閉而耳忽

聾者宜鮮荷有因大聲喊叫右耳失聰以外觸驚氣內應肝胆胆

脉絡耳震動其火風之威致聾而阻竅成聾者當治少陽忌食腥

濁宜清有男子真陰未充虛陽易升乘竅致形體日瘦咳嗽耳聾



左耳尤甚者亦須清少陽

宜清熱解鬱湯

有年久耳聾者

宜勝金透關散

然耳聾

者音聲閉隔竟一無所聞者也亦有不至無聞但聞之不真者名

爲重聽其症之來或由風氣壅耳常覺重聽頭目不清

宜清神散聰耳湯

或由腎經熱致右耳聽事不真

宜地黃湯

不得竟爲耳聾而以治聾方

藥投之若乃耳鳴者聾之漸也惟氣閉而聾者則不鳴其餘諸般

耳聾未有不先鳴者夫鳴何以故靈樞曰上氣不足耳爲之苦鳴

又曰髓海不足則腦轉耳鳴又曰耳者宗脈所聚胃中空則宗脈

虛宗脈虛則下流脉有所竭故耳鳴內經曰一陽獨嘯少陽脈也

註云嘯謂耳鳴一陽謂膽三焦膽三焦脉皆入耳故氣逆上而耳

鳴正傳曰腎水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴不治必至聾聾醫鑑

曰痰火上升兩耳蟬鳴漸欲聾据此數說亦可知耳鳴之所由來

矣總之右耳屬腎左耳屬肝其鳴之故必先由肝腎之氣虛又爲

風火痰氣之所乘故其鳴也。或如蟬噪。或如鐘鼓。或如水激。不一

而足。而其為治亦有當分者。如正氣與風邪相擊而虛鳴。須先散

邪。宜芎散。腎氣虛。宗脈虛。風邪乘入而鳴。須先祛邪下氣。宜五苓散

蘇香丸而後加以和養。宜芎歸散。痰火升上而鳴。須理痰清火。宜加減

湯復聰。湯腎精不足。陰虛火動而鳴。須溫腎益精。宜補腎丸滋大

約。由于痰火者。其鳴盛。由于腎虛者。其鳴微。此其辨也。肝家本來

火甚。或為風乘痰客而鳴。須先清肝。兼治風痰。宜加減風熱酒熱。

上貫于耳而鳴。須用擴清之注。宜通聖散加柴枳。卒然而鳴。且失

聰。須以開通為主。宜蠲稍此則耳鳴之症也。至于耳之雜症不一。

可得而悉言之。若耳中本有津液。風熱搏之。津液結硬成塊。壅塞

耳竅。氣脈不通。疼痛不止。亦令耳聾。名曰聾耳。宜梔子清肝湯聾

耳由來。亦復有辨。不止風熱相搏一端也。有風溫之邪上鬱耳聾。

耳。

右脹者。宜馬勃散有左耳聾痛。舌白脉數。由體質陰虛。挾受暑風。上焦

氣鬱。須用辛涼輕藥者。宜菊葉苦丁山梔飛滑石連喬淡竹葉有暑熱上鬱耳聾作

脹。咳喘氣熱當清者。宜六一散加杏仁連喬壳淡竹葉川貝母白沙參有頭重耳聾緣

少陽相火上鬱。須以辛涼清解上焦者。宜羚羊角湯有先起咳嗽。繼而

聾耳脹痛。延綿日久不愈。由本陰虧。風溫相觸。未經清理。外因傷

及陰分。少陽相火陡起。至入暮厥痛愈劇。須先清降。後議育陰者。

宜益元散加菊葉苦丁川貝有諸般聾耳。出膿水且臭。宜穿山甲

金銀花菜豆皮鮮荷梗葉少許吹之。日或乾結不出者。宜白蚯蚓入葱葉中化為水滴有勞

三四次愈。傷氣血熱氣。入于其經。隨鬱而成聾耳。或出膿水者。宜柴胡

外吹氣此則聾耳之症也。耳腫耳膿者。乃風邪乘少陰經上入于

耳。熱氣聚則腫而生痛成膿。宜蔓荊子散或風熱上壅腫痛。日久

膿出。膿不去。則塞耳成聾。宜鼠粘子湯或由肝氣壅滯。三焦火動。

犀角散子

胆湯然。大人則有虛火。寔火之分。小兒則有胎熱。胎風之別。虛火
若何。必耳內蟬鳴。或重聽。出水作痒。外不焮腫。宜金匱腎氣丸
加菖蒲四物湯寔
火若何。必耳根耳竅俱腫。甚則寒熱交作。疼痛無時。宜柴胡
清肝湯胎熱
若何。或洗沐水。悞入耳。作痛生膿。初起月內。不必治。項內生腫。後
毒盡自愈。月外不瘥。治之。宜紅棉
散敷之胎風若何。初生風吹入耳。以致
生腫出膿。宜魚牙
散吹之此外又有肝風鬱滯。其內生瘡有膿者。宜東垣
鼠粘子
湯抑肝消毒散外有耳出臭膿。宜竹蚌屑
脂还子等
分麝少許共末吹之或出血。宜
龍
骨末或耳疳出膿者。宜抱出
雞卵壳妙黃為
末油調灌之疼即止有耳出膿汁。或聾而
鳴。屬上焦風熱者。宜蔓荊
子散有耳中忽大痛。如有虫蠕動。或膿出。或
血出。或水出。或乾痛者。宜蛇壳燒存性以
鷄翎管吹入即止有耳內濕瘡腫痛。或有
膿水者。宜涼膈散加酒大黃酒黃芩
荆防羌活以解上焦風
熱外用蛇床子黃連各一錢輕粉一字為末吹之有耳
後忽然腫痛。悉屬肝火者。此症恒見于婦女。急當平肝降火。兼舒

鬱。宜柴胡清肝湯若有表症。兼發寒熱散之。宜荆防敗毒散有耳後腮邊

忽然腫痛。悉屬陽明蘊熱者。宜清胃敗毒散或有耳根連牙床腫

痛。悉屬上焦風熱鬱抑者。宜升麻白芷連翹荆芥防風薄荷甘草

地等若勢甚。有風毒耳腫痛出血。宜柳蠶糞化水取清汁或卒熱

腫痛。宜木鼈仁一兩大黃赤小豆各五或底耳腫痛汁水不絕者。

宜桑螵蛸一個燒存性麝少許研末有風溫發熱左耳後腫痛者

宜乾荷苦丁有耳熱出汗作痒。由于痰火者。宜元參有耳痒一日

一作直爬出血畧愈。明日又作。悉屬腎虛致浮毒上攻者。此不可

以常法治。必先忌酒麵鷄鶩猪羊一切辛熱之物。及房慾。至四十

九日。服藥乃有效。宜透骨丹元有耳內外生瘡。由肝經血虛風熱。

宜當歸川芎湯柴或肝經燥火風熱。宜柴胡清肝湯必寒熱作痛。

宜小柴胡湯逍遙散加山梔川芎甚有內熱口乾。屬腎經虛火者。宜加味有耳輪生瘡。

名耳發疳屬手少陽三焦經熱者。宜涼有耳生爛瘡。宜聖子去核

香油耳後月蝕瘡。宜燒蛇蚶糞兩耳凍瘡。宜生薑汁皆作腫痛者

以上皆發腫痛痒瘡膿之症也。雖然此皆由內發者亦有外侵之

患。可勿論諸歟。如飛虫之入耳也。宜雞冠血滴入即出蠅蟻之入

耳也。宜鯨鱉甲燒研馬蝗之入耳也。宜田中泥一盆蚰蜒之入耳

也。宜牛乳少少滴入即出若入腹蜈蚣之入耳也。宜炙猪肪掩耳

蠅入蚤虱之入耳也。宜菖蒲末炒熱絹飛蠅之入耳也。宜皂角蠹

魚血諸物之悞入耳也。宜三寸長弓絃一頭打散種種之害雖非

常有。然其治法有不可不備者。故為遍攷方書類係于此。總之耳

病之原風則腎脈必虛。熱則腎脈必數。虛則腎脈必溢。氣鬱則腎

脈必沉滯。此為久病之脈。暴病則必浮洪。若兩尺相同則陰火上

沖矣。蓋以腎發竅于耳。故耳病必以腎脈為消息。再兼診他脈。此

其大法也。

脉法 脉經曰左寸洪數。心火上炎。兩尺洪數。相火上炎。其人必遺精夢洩。而耳或鳴或聾。又曰病耳聾。脉大者生。沉細者難治。醫鑒曰腎脉浮而盛。爲風。洪而寔。爲熱。細而澁。爲虛。圓春曰耳病腎虛。遲濡其脉。浮大爲風。洪動火賊。沉澁氣凝。數是熱塞。久病聾者。專于腎責。暴病浮洪。兩尺相同。或兩尺數。陰火上衝。

耳病原由症治 綱目曰耳目之陰血虛。則陽氣之加。無以受之。而視聽之聰明失。耳目之陽氣虛。則陰血不能自施。而聰明亦失。則耳目之聰明。必血氣相須。而始能視聽也。入門曰聾在右。男子多有之。以多色慾也。聾在左。女子多有之。以多鬱怒也。聾兼左右。膏粱之家多有之。以多甘味也。又曰久聾腎氣虛。

耳絕不聞者難治。薛立齋曰：耳鳴脈數，黑瘦人屬血虛，四物加山梔、柴胡。右寸關大于左，無力、倦怠、色黃白，屬中氣虛，補中益氣湯加減。若氣血俱虛，八珍湯加柴胡。若因怒便聾或鳴，屬肝膽氣濁，小柴胡加芎歸、山梔。又曰：耳聾耳鳴，須分新久虛實，忽因大怒大醉而聾或鳴者，屬痰火，又分輕重治。中年及病後虛弱人，悉屬虛，但分氣血耳。治之必大補氣血，滋陰制火，使虛火下伏。陽氣上行，充塞流動，則九竅咸利，而聾鳴悉除。經曰：腎氣通于耳，耳和則知五音矣。瘍科選粹曰：耳中生毒，皆由足少陰手少陽二經風熱上壅所致，其症有五：曰聾耳，曰耳濕，常出黃膿，有耳風毒，常出紅膿，有纏耳，常出白膿，有耳疳，生瘡臭穢，有震耳，耳內虛鳴，時出清膿。雖症有五，而其源歸一。又有耳聾耳痔，不作膿，亦不寒熱，外無腫，但外塞不通，纏綿不已，令

人耳聾。用黃連消毒飲仙方活命飲治之。若寒熱間作。內外紅腫。疼痛日增者。爲耳癰。用活命飲加升麻桔梗。或一粒金丹以下之。亦有寒熱大作。痛不可忍者。疔也。以疔治之。又曰。肝火左脉弦數。其人多怒。耳鳴或聾。宜平肝伐木。龍胆瀉肝湯。不已。龍耆丸。葉天士曰。腎開竅于耳。心亦寄竅于耳。心腎兩虧。肝陽亢逆。故陰精走洩。陽不內依。是以耳鳴時聞。但病在心腎。其原寔由于鬱。鬱則肝陽獨亢。令膽火上炎。當早服九料以補心腎。用熟地四兩。龜板二兩。麥冬牡蠣白芍建蓮茯神各兩半。五味磁石各一兩。沉香辰砂各五錢。砂爲衣。午服湯藥。以清少陽。以胆經亦絡于耳也。用女貞子三錢。生地二錢。牛夏枯草二錢。赤苓錢半。丹皮山梔各一錢。生甘草四分。又曰。七八十而耳聾。乃理之常也。蓋老人雖健。下元已怯。是下虛上實。清竅不主清暢。

惟固補下焦使陰火得以潛伏用磁石六味丸加龜甲五味遠志。

耳病導引法 保生秘要曰凡搓掌心五十度熱閉耳門空觀次又搓又閉又觀如此六度耳重皆如此導法兼以後功無不應驗。

運功 保生秘要曰用意推散其火男則用逆收藏于兩腎之間女則用逆歸藏于兩乳之下或耳中或按耳門內若蟬鳴咽津液降氣安。

耳重導引法 保生秘要曰定息坐塞兌咬緊牙關以脾腸二指捏緊鼻孔睜二目使氣串耳通竅內覺哄哄然有聲行之二三日竅通爲度。

運功 保生秘要曰時常將兩耳返聽于歸元取靜或存閉口。

中氣及鼻中氣使不妄出。單意想從耳中出，又收返聽耳自然聰矣。

修養法 養生書曰：以手摩耳輪，不拘遍數。所謂修其城郭，以補腎氣，以防聾聵也。又曰：養耳力者常飽。

治耳病方七十五

透鐵閉法

總治 活磁石二塊，剉如棗核大，搽麝香少許。于磁石尖上塞兩耳竅，中口內含生鐵一塊，候一時兩耳氣透，颯颯有聲，為度。勤用三五次，即愈矣。
此方專治一切耳聾。

透耳筒

又 椒目 巴豆肉 石菖蒲 松脂 各五分
共為末，以蠟鑄化，和勻作筒子樣，棉包納耳中，日易一次，神效。
此方專治腎氣虛耳鳴，如風水聲，或如鐘磬響，或卒暴聾，皆效。

通神散

又 蝎子全者一个 土狗一个 地龍二條
白礬半生半枯 雄黃各五分 麝香二分

半 共為末用葱白蘸藥入耳中閉氣面壁坐
一時三日一用自愈

此方大治耳聾

凡邪氣閉塞或由于虛而為聾聵者當用透開
通氣之藥故特先列三方于前以備採用

益腎散

腎虛 磁石 巴戟 沉香 菖蒲 川椒
等分每末二錢用猪腰一个細切和葱白食塩
紙包燭空心酒下

六味丸

又 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤
瀉

磁石六味丸

老牛 磁石 熟地 山藥 山萸 丹皮
茯苓 澤瀉

人參養榮湯

勞損 人參 茯苓 白朮 甘草 當歸
白芍 熟地 黃芪 遠志 肉桂 陳皮
五味子 姜 惠

調中益氣湯

病後 人參 黃芪 蒼朮 甘草 陳皮
木香 升麻 柴胡 此即補中益氣湯去當
歸白朮換木香蒼朮也

流氣散

防風通聖散

風藥 防風 荊芥 麻黃 連翹 薄荷
川芎 當歸 白芍 白朮 山梔 大黃

芒硝 黃芩 石膏 桔梗 甘草 滑石

酒製通聖散

右藥 即防風通聖散諸藥俱用酒炒倍入酒
慢大黃再用酒炒三次水煎食後服

磁石羊腎丸

耳聾 磁石三兩煨再用葱白木通各三兩全
煮一伏時取石研水飛用二兩 川芎 羌活 獨活

子 白朮 川椒 防風 肉桂 六錢半 石菖蒲兩
辛 草薢 遠志 川烏 木香 當歸 黃

芪 鹿茸各一兩 肉桂六錢半 石菖蒲兩
半 熟地二兩 羊腎二對酒煮爛搗加酒糊

丸 空心溫酒或鹽湯下五十丸
此 總治一切耳聾補虛開竅行鬱疎風去濕

桂花散

肉桂二分 麻黃 川芎五分 木通 當歸六分
細辛 木香 甘草 木通 南星

白茯苓各三分 菖蒲八分 白芷四分 紫
蘇五分

開痰散

厚朴

芎芷散

虛聾 川芎一錢半 白芷 細辛 陳皮
蒼朮 菖蒲 厚朴 半夏 木通 肉桂

蘇葉 甘草各七分 姜三 葱白二

清神散

氣壅 甘菊 羌活 姜蚕各五分 木通
川芎 防風 荆芥 木香 甘草 菖蒲各
四分 每末二錢米湯下

神芎丸

氣塞 大黃 黃芩 牽牛子 滑石 水丸

通鳴散

小兒 菖蒲 遠志各一兩 防風 柴胡
麥冬各五錢 甜葶藶 細辛各二錢 杏仁
十四个 磁石一錢 每末五分葱湯下

菖蒲丸

又 菖蒲一寸 巴豆七粒 研分七丸每一
丸綿包塞耳內

滋陰降火湯

右 生地 當歸 黃柏 知母 川芎
赤芍 薄荷 菖蒲 姜 風加防風痰加胆
星火盛加元參

當歸龍薈丸

左 當歸 龍胆草 盧薈 甘草 甘菊
花 黃芩 荆芥 生地 赤芍 痰加姜製
半夏

加減龍薈丸

痰火 酒龍胆 酒當歸 黑山梔 黃芩
請皮各一兩 酒蒸大黃 柴胡 青黛各五

錢 蘆薈 胆星各三錢 木香二錢半 麝香五分 神曲糊丸 鹽湯下二十九日三服後用針砂酒以通氣

針砂酒

又 針砂三錢 銅銕內炒紅以陳酒一杯將針砂淬入待溫砂亦澄下飲酒

四物湯

虛火 川芎 地黃 白芍 當歸

金匱腎氣丸

又 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤瀉 附子 肉桂 車前子 牛膝

柴胡清肝湯

寒火 柴胡 黑山梔各一錢半 黃芩 甘草 芍藥 人參各一錢 連翹 桔梗各八分

紅棉散

此方治肝膽三焦風熱怒火之症 胎熱 乾胭脂二錢 枯凡三錢 麝香一分 半 共研末先將綿捲去膿汁再將棉蘸藥末捲入耳內

涼膈散

濕熱 連翹 甘草 薄荷 山梔 黃芩 大黃 芒硝

五苓散

又 茯苓 澤瀉 白朮 白芍 肉桂

魚牙散

胎風 江魚牙煨研和冰麝少許吹入

蝟稍挺子

卒鳴 川山甲一八片以蛤粉炒赤 蝟稍七
个 麝香少許 共為末以麻油化蠟和作挺子
棉裹塞之

梔子清肝湯

取耳 山梔 菖蒲 柴胡 當歸 黃芩
黃連 丹皮 甘草 牛蒡子 先以生猪脂
地龍百草霜為末和葱汁捏如棗核大棉包塞
耳縫日待軟挑出後服此藥

荆防敗毒散

腫痛 荆芥 粉草 連翹 川芎 羌活
獨活 五加皮各七分 角刺 穿山甲炒
歸尾 防風 蒼朮 酒防已 地骨皮各一
錢 白鮮皮 金銀花各錢三分 土茯苓一
兩 煎好加酒食後服

蔓荊子散

此方兼治楊梅瘡初發者
熱風膿 炙草 桑皮 升麻 木通 甘菊
花 前胡 赤芍 生地 麥冬 蔓荊子
赤苓各七分 姜三 蜜二

桃花散

吹耳 石灰十兩 麻油半盞 大黃一兩煎
汁半盞 石灰炒紅入油汁慢火炒如桃花色
瘡膿 山梔 柴胡 黃芩 連翹 防風
抑肝消毒散 荆芥 甘草 赤芍 歸尾 燈心 金銀花

渴加天花粉

三仙散

吹耳 胆汁炒黃柏 酒炒紅花 冰片少許

龍膽瀉肝湯

肝火

清胃敗毒散

胃熱 赤芍 歸尾 甘草 黃芩 連翹
花粉 荊芥 酒大黃 金銀花

三清救苦丹

火 大黃二兩 姜蚕一兩 共為末入枯礬
一錢蜜丸彈子大嚥化
此方兼治發頤

肉蓯蓉丸

腎虛 肉蓯蓉 山萸 石菖蒲 金石斛
巴戟 磁石 鹿茸 兎絲子 茯苓各二兩
沉香 川椒各一兩

聰耳蘆薈丸

肝胆火 熟大黃 蘆薈 青黛 柴胡各五
錢 龍胆草 當歸 青皮 血梔 黃芩各
一兩 木香 南星各二錢 麝香五分 神

黃連消毒飲

中痛

仙方活命飲

又穿山甲 白芷 防風 赤芍 甘草 歸尾 花粉 貝母 皂角刺 各一錢 金銀

一粒金丹

花柳末 陳皮各三錢 乳香 沒藥各一錢 二味 另研末 沉香 水酒煎送 乳香 二味 水煎亦可 又沉玉樞丹 乳香 木香 各五分 巴霜一錢 半即玉樞丹 又各紫金錠 各為末 照末數 和勻用黑棗丸 芡寔大每一丸 量人虛實先呷 水一口行一次 胃寔人只可呷三四口 再用水 下一丸米飲止之

磁石六味丸

老年 熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 磁石 木通 當歸 甘草 赤芍 元參 各二錢 川芎 薤白 蔓荊子 各五分

加味犀角飲

風熱 犀角 木通 當歸 甘草 赤芍 元參 各二錢 川芎 薤白 蔓荊子 各五分

滋陰地黃湯

色慾 熟地 一錢 山藥 山萸 當歸 白芍 川芎 各八分 丹皮 澤瀉 茯苓 遠志 菖蒲 酒知母 酒黃柏 各六分

清聰化痰丸

此方亦治大病後耳聾 兩耳聾 去白橘紅 鹽水洗 蔓荊子 赤芍 各一兩 酒生地 酒黃芩 八錢 酒黃連 酒浸煨白 芍 酒生地 姜半夏 曲 柴胡 各七錢 人參 六錢 醋青皮 五錢 生甘草 四錢 葱湯

浸蒸餅九茶清下百丸

燒腎散

腎虛 磁石醋淬七次 附子炮 川椒炒
巴戟各一兩 為末每用猪腎一個細切葱白
韭白各一錢藥末一錢蓋一匙拌和濕紙包煨
熟空心細嚼酒下十日效

姜蟬散

久聾 全蝎四十九个去毒酒洗焙 生薑切
片如蟬大四十九片共炒乾為細末向夕勿食
夜臥酒調作一服連至二更徐盡量飲之至
五更耳中聞百十聲響自此聞聲
此方專治腎虛久聾十年內者一服即愈

聰耳湯

重聽 酒黃柏一錢 酒當歸 酒白芍 酒
生地 酒知母 酒羌活 酒獨活 酒藜蘆
川芎 陳皮 烏藥 白芷 防風 薄荷
葉 蔓荊子各五分 細辛三分 水煎食後
服服後低頭睡一時

地黃湯

又 活磁石煅淬二兩 酒炒生地一兩半
枳壳 桑皮 防風 黃芩 木通各一兩
生甘草五錢半 每末四錢水煎服日二

芎歸飲

和養 川芎 當歸 細辛各一錢 肉桂
藹蒲 白芷各七分 紫蘇七葉 姜三片

補腎丸

熟地 兔絲子各八兩 歸身三兩半
山萸二兩半 酒知母 酒
黃柏各一兩 補骨脂五錢 酒
下 糊丸空心鹽

滋腎通耳丸

酒洗生地 當歸 白芍 川芎各一錢
酒知母 酒黃柏 酒黃芩 香附 香白
芷 柴胡各七分

柴胡聰耳湯

連喬三錢 柴胡二錢 人參 當歸
甘草各一錢 姜三片 水二盞煎一盞
去渣入水蛭五分 蜜虫三枚 麝香一分 再一沸
服

荊芥連喬湯

荊芥 連喬 防風 當歸 川芎
白芍 柴胡 黃芩 枳壳 山萸 白芷
桔梗各七分 甘草五分 食後溫服

鼠粘子湯

酒黃芩 酒山梔 連喬 元參 鼠粘
子 桔梗 甘草 龍胆草 板藍根各一錢
食後服隨飲酒一二杯

犀角飲子

犀角 水通 元參 菖蒲 赤小豆
赤芍 犀角 甘菊 各一錢 甘草五分 姜三片
面部 耳病方

東垣鼠粘子湯

耳癢 桔梗一錢半 黃芪 柴胡各七分
鼠粘子 酒生地 連喬 歸尾 虎草 黃
芩 生草各五分 昆布 蘇木 龍胆草
蒲黃 川連各三分 桃仁三个 紅花酒炒
一分 食後服

元參貝母湯

耳癢 鹽炒黃柏 防風 貝母 蘆粉 茯苓
元參 白芷 半夏 天麻 蔓荊子各
一錢 甘草五分 姜三

透水丹

川烏 大黃 茯神 山梔 威靈仙
蔓荊子 茯苓 益智仁 天麻 仙靈脾
白芷各五錢 醋煨京墨另研 麝香各錢一
分 蜜和杵干下丸 芡子大薄荷汁 冲溫酒下
二三九
此方兼治風熱上攻頭面腫痒痰涎壅塞口乾
胸膈下注腰脚腫痛生瘡大小便閉及左癱右

當歸川芎湯

當歸 川芎 柴胡 白朮 赤芍各
一錢 山梔錢二分 丹皮 茯苓各八分
甘草 蔓荊子各五分 水煎
肝氣不平寒熱去木加地骨皮
用寢去木加柴胡黃芩
氣血虛去柴胡山梔蔓荊子加參芪歸地

脾虛飲食不思去柴胡山梔蔓荆子倍茯苓

肝氣不順胸膈不利小腹痞滿去當歸白朮加

青皮痰滯加半夏

肝血不足將逆去山梔加熟地

肝血虛寒小腹時痛加肉桂

北方嵩治手足少陽經血虛瘡症及耳熱耳痒

又生若出水或婦女經水不調胸膈痞悶

當歸白朮白芍茯苓神柴胡甘

各一錢姜三

人參半夏柴胡黃芩甘草

小柴胡湯

加味地黃片

八珍湯

馳風清火湯

鮮荷葉湯

山梔鮮荷葉青菊葉夏枯草黃芩

清胆湯

驚觸苦丁茶蔓荆子連喬

清熱解鬱湯

青蒿汁鮮荷葉汁桑葉丹皮山梔連喬象貝

勝金透閑散

紅色者活鼠一个繫定熱湯浸死破喉取胆紅者是也川烏頭一个炮去皮細辛二錢胆礬五分為末以鼠胆和勻再焙乾研細入麝香半字用鷺翎管吹入耳中口含茶水日二次十日見效永除根本

馬勃散

馬草馬勃 薄荷 桔梗 連翹 杏仁

羚羊角湯

子 羚羊角 薄荷梗 連翹 丹皮 牛蒡桑葉

鼻病源流

沈金鰲撰

鼻爲肺竅。外象又屬土。故寒傷皮毛。則鼻塞不利。新者偶感風寒。

必兼噴嚏。涕聲重。宜參蘇飲。羌活中和湯。若久而有根。畧感風寒。鼻塞便

發。必須清金降火。宜白芷荆芥。若風熱壅盛。鬱于肺中。亦致鼻

塞聲重。宜疏散之。宜抑金散。川芎茶調散。肺火盛。反能塞鼻。必兼清解。宜黃

肺鼻塞甚者。往往不知香臭。宜葶苈。或始而鼻塞。又爲風冷所傷。

津液凝滯。其冷氣入腦。不消結成硬瘰。使腦氣不宜。遂流髓涕。宜

星飲芎藭散。又有火鬱清道。不聞香臭者。宜鼻不聞。又有鼻痔者。始而

鼻內生瘰。窒塞不能聞味。宜通。瘰久不愈。結成瘰肉。如棗核塞于

鼻中。氣塞不通。由胃中有食積。熱痰流注。故氣凝結也。宜星夏湯。

散蠅。或由肺氣熱極。而爲瘰肉。宜黃連清肺飲。加海藻外以辛夷膏塞之。或瘰肉結如

榴子。漸至下垂。孔竅閉塞。氣不得通。此由肺氣不清。風熱鬱滯。而

成也。宜辛夷消風散黃芩清肺飲辛夷荊芥散外以瓜蒂散塞之。必戒厚味嗜慾甚有鼻中瘕

肉臭不可近痛不可搖者亦由膏梁氣積濕熱蒸于肺門如雨霽

之地突生芝菌也。宜勝濕湯瀉白散外以白礬末加硼砂又有鼻

淵者即腦漏也由風寒凝入腦戶與太陽濕熱交蒸而成或飲酒

多而熱熾風邪乘之風熱鬱不散而成經云胆移熱于腦則辛額

鼻淵其症鼻流濁涕或稠涕若膿血腥臭難聞或流黃水長濕無

乾久必頭眩虛運不已。宜奇授藿香湯天麻餅子又有鼻鼈者鼻

流清涕不止由肺經受寒而成也。宜蒼耳散甚有鼻塞腦冷清涕

不止者。宜細辛膏又有鼻內生瘡者由脾胃蘊熱移于肺也。宜涼膈散

以辛夷末入水齧少許綿裹塞之。或鼻孔乾燥漸生瘡腫痛由肺本經火甚也。宜

或口鼻生疳蝕爛亦為肺脾胃三經之熱。宜青鋌搽患又有鼻

痛者由風邪與正氣相搏竅道不通故痛也。宜通氣如痰火冲肺

亦令鼻膈隱痛。

宜二陳湯加山梔。桔梗、麥冬、黃芩。

又有鼻上紅腫似瘡，非瘡，俗名

酒鼓鼻者，由飲酒

血熱濕熱上攻于肺，外禦風寒，血凝不散而成。

也。

宜疎風散劑。

防亦有不飲酒而色赤者，名肺風瘡，由血熱鬱肺。

不散也。

宜清肺飲子，或四物五苓。

又有粉刺者，與皴鼻、肺風三名。

同種粉刺屬肺，皴鼻屬脾，二者初起俱色紅，久則肉飽發腫。

宜枇杷葉

丸外以白龍散塗或洗。

總皆血熱滯而不散之故。又有面鼻紫黑者，面爲陽

中之，鼻居面之中，一身之血運到此，皆爲至清。酒家則酒氣熏

蒸面鼻，血爲極熱，熱血遇寒汚濁凝滯而不行，故色成紫黑也。急

宜化滯血生新血。

宜清酒四物湯，氣弱加酒黃芪。

鼻之爲病如此，總之肺和則鼻

自無病，安可不急急于手太陰以圖治哉。

脉法

正傳曰：左寸脉浮緩爲傷風，鼻塞流涕；右寸脉浮洪而

數爲鼻衄鼻熱也。

按鼻皴之脉，右亦洪數。

鼻病原由症治

正傳曰鼻淵者外寒束內熱之症又曰鼻色

青腹中痛苦冷者死

靈樞曰鼻頭色青爲痛色黑爲勞色赤

爲風色黃爲便難色鮮明者留飲也

三因曰鼻頭微白者亡

血也赤者血熱也酒家多有之

本草單方曰鼻中諸疾有鼻

淵鼻鼽鼻窒鼻瘡及痘後鼻瘡並用辛夷研末入麝少許葱白

蘸入數次甚良其專治鼻淵腦瀉用藕節川芎焙研爲末每二

錢米飲下或腦崩流汁鼻中時流黃水腦痛名控腦砂有虫食

腦中也用絲瓜簾近根三五尺燒存性每一錢酒下以愈爲度

又以兒茶末吹之良其鼻中瘰癧肉用狗頭灰方寸匕苦丁茶半

錢研末吹之卽成水或同硃砂少許尤妙又用地龍炒一分牙

皂一挺爲末蜜調塗清水滴盡卽除其齕鼻作臭用雞腎一對

與臍前肉等分入豉柒粒新瓦焙研雞子清和作餅安鼻前引

垂出思陰人雞犬見其鼻滄膿鼻有垂也用苦參枯礬一兩生地汁三合水二盞煎三合少少滴之又元參末塗之或以水浸軟塞之其滑腫口鼻又蛤燒灰臘猪油和塗又人中白一錢銅綠少許研敷甚或穿唇透頰數日欲盡急用銀屑一兩水參片銅器內煎一升日洗三四次其鼻皴赤皰用蜜陀僧二兩研細人乳調夜塗旦洗亦治痘瘡癰腫又桑黃能除肺熱故治赤鼻及肺火成癰其鼻擦破傷猫頭上毛剪碎唾粘傳之

鼻病修養法 養性書曰常以手中指于鼻梁兩邊指二三十遍令表裡俱熱所謂灌漑中岳以潤于肺也 常去鼻中毛謂神氣出入之門戶也

鼻淵導引法

保生秘要日用中指尖于掌心搓令極熱熨搓迎香二穴可時搓時運兼行後功 此法并治不聞香臭

保生秘要曰。歸元念絡過命門。想腎水升上崑崙。降臍
 次從左乳下經絡。推至湧泉。噓而吸之。又行鼻間。通患處。則從
 左鼻助。至左湧泉。後又念臍絡過腎俞。想水灌頂。歸覆臍。或
 頰紅及鼻。但推紅處撒散。升腎水洗臍。久自退矣。
 鼻血導引法 保生秘要曰。開二目。鼻朝天。吸氣得法。咽吞如
 此。久吸。久咽。血見津而自面。兼行後功。氣脈自和也。
 通功 保生秘要曰。觀鼻端定神。漸運入內。逆上頂門。轉下于
 背。經元海。逆湧泉而定神。

治鼻病方三十三

川芎茶調散

風寒
刺芥

川芎

薄荷

羌活

甘草

防風

抑金散

肺熱
八分

細辛

白芷

防風

羌活

川芎各
當歸身

一錢

桔梗

陳皮

茯苓

各七分

黃連清肺散 風火

通草散 鼻淵 通草 炮附 細辛 蜜丸 棉裹塞

辛夷消風散 痼肉 辛夷 黃芩 薄荷 甘菊 川芎 桔梗 防風 荊芥 甘草 生地 赤芍

黃芩清肺飲 又 防風 天花粉 川芎 當歸 赤芍 生地 黃芩 二

分 薄荷三分

辛夷荊芥散 又 神曲 辛夷一錢 荊芥 黃芩 南星 半夏

蝴蝶散 又 神曲 白芷 荊芥 黃芩 南星 半夏

星夏散 鼻淵 南星 半夏 蒼朮 神曲 細辛 白芷 甘草 黃芩 酒炒 黃連 酒炒 枯礬

瓜礬散 鼻內 瓜礬 各四錢 甘草一錢 枯礬 螺壳 灰 草烏 灰各五分 麻油調作丸 每日一次塞

鼻內 令達痔上即化水愈

辛夷膏 又 杏仁 各五錢 細辛 木通 木香 白芷 羊髓 猪脂 各二兩 石器內

面
角
卷
三
十
三

輕黃散

慢火熬膏赤黃色待冷入木麝各一錢爲丸棉裹塞鼻數日脫落即愈
瘰癧 杏仁 輕粉各一錢 雄黃五分 麝香少許 卧時點鼻內

涼膈散

山查 枳殼 赤芍 防風 荊芥 花粉 石膏 桔梗 黃芩 甘草 薄荷 黃芩 甘草

疏風散

赤芍 歸尾 荊芥 燈心 白蒺藜 黃芩 甘草

荆防瀉白散

荊防 甘草 生地 黃芩 桑皮 元參 赤芍 金銀花

赤鼻方

又 枇杷葉 白果 芽茶 芭蕉根 蜜丸 黍米 大每二錢湯下

四物湯

肺風 川芎 當歸 白芍 生地

五苓散

又 白朮 澤瀉 茯苓 肉桂 猪苓

枇杷葉丸

粉刺 枇杷葉八錢 黃芩四錢 花粉二錢 甘草一錢 酒丸每一錢五分白湯下忌火酒煎炒辛熱之物

真君妙貼散

奇授藿香湯

鼻淵 廣藿香五錢 水一碗煎七分加猪胆汁一枚和服若將胆汁熬膏入藿香末一兩作丸分二錢湯下亦可

天麻餅子

又

防風散

又

防風三錢 川芎各二錢

黃芩

麥冬

人參

甘草

羌活冲和湯

鼻塞

參蘇飲

又

華澄茄丸

又

薄荷葉二錢 荆芥穗一錢 華澄茄二錢 分 盛九櫻桃大含化 南星二錢 沸湯泡二次焙乾 大棗七個 甘草少許 全煎食後服三四帖後其硬物

南星飲

面部

鼻

卷二十三

芎藭散

自出腦氣流轉髓涕自收再以葦撥香附大蒜
肉搗作餅紗襪貼額門鬃斗熨之
又芎藭 檳榔 麻黃 肉桂 防已 木
通 細辛 白芷 菖蒲 各七分 木香 川
椒 甘草 各三分半 姜三片 蘇葉七片

勝濕湯

總肉 白朮三錢 人參 乾姜 白芍 附
子 茯苓 桂枝 甘草 各七分半 姜三
又地骨皮 桑皮 各二錢 甘草 一錢 或
母貝母 生地 麥冬 桔梗 山梔 亦可
薄荷 三錢 細辛 白芷 羌活 防

瀉白散

鼻不香臭方

陳皮 各一錢
當歸 川芎 半夏 桔梗 赤茯苓
玉 各一錢

黃芩湯

鼻瘡 酒黃芩 山梔 桔梗 赤芍 荊芥
穗 桑皮 麥冬 薄荷 連翹 各一錢 甘
草三分

通氣驅風湯

鼻痛 烏藥 一錢半 川芎 白芷 桔梗
陳皮 白朮 甘草 各一錢 麻黃 枳殼
人參 各五分 姜三 芎二

口齒唇舌病源流

沈金熬撰

口者脾之竅也。能知五穀之味。又諸經皆會于口。病則口中之味。隨各經而異。如肝熱則口酸。肝乘脾亦口酸。宜小柴胡湯加龍胆。心熱則口苦。或生瘡。宜涼膈散。肝移熱于膽亦口苦。內經言胆瘴是也。註云。肝主謀。膽主決。或謀不決。為之急怒。則氣上逆。胆汁上溢故也。宜龍胆湯。脾熱則口甘。或臭。內經言脾瘴是也。蓋瘴者。熱也。宜葛黃散。胃熱亦口甘。若虛則口淡。宜養胃湯。虛肺熱則口辛。宜甘桔湯。更有甚而喉腥者。宜加減腎丸。熱則口鹹。宜滋陰丸。熱蘊于胸胃之間。則口臭。宜甘露飲。或心勞味厚之人。亦口臭。宜加減。或肺為火燔。亦口臭。宜消風散。或吐膿血如肺癰狀。而口臭。宜局方。他方不應。宜升麻。臍胸積熱。則口糜。口糜者。口瘡糜爛也。宜局方。心熱亦口糜。口瘡多赤。宜花柳。肺熱亦口糜。口瘡多白。宜黃柏。

面部 口齒唇舌

良久以膀胱移熱于小腸亦口糜。宜移熱湯柴胡地骨皮湯心脾有熱亦口糜。

水漱口宜升三焦火盛亦口糜。宜同春中焦氣不足虛火上泛亦口糜或

麻散服涼藥不效。宜理中湯陰虧火泛亦口糜。宜四物湯內熱亦口糜并咽

喉腫痛。宜冰柏丸或口瘡臭腐多膿。宜杜筵散傷寒狐惑虫蝕其臟則上

唇生瘡虫蝕其肛則下唇生瘡是臟腑之病未嘗不應諸口凡口

瘡者皆病之標也治者當推求其本焉而所以推求之法不外乎

五味之異以察五臟之屬耳別有內疳瘡生上腭如蓮蓬蒂下垂

初小漸大必宜以小鈎刀去其根燒鐵烙以止其血然後以碓黃

輕粉粉霜白芷白欬為細末以敷之仍以槐枝起其牙一二時許

瘡口自合次日膿出另當以藥敷之。宜生肌散若上腭腫硬內熱體倦

作勞乃多骨疽也。宜補中益氣湯腎氣丸夫多骨疽多有發于手

背足背等處不專在上腭者其症皆腫硬一塊久而脫去一骨者

便是其原均屬虛。腎主骨也。或由瘡疽潰久不能收斂。總因氣血不足。腎水素虧。復為寒邪所觸。致患處之骨腫突而起。日漸長高。先宜用葱熨法。使寒邪祛散。接補榮氣。其骨自脫。骨脫之後。仍服補劑。宜十全大補湯。腎氣丸。若誤用剋伐藥。則元日虛。邪反甚。取危之道也。此則統治多骨疽之法。特詳悉于此。凡生他處者。依法治之可也。至取多骨有法。亦宜考求。宜取朽骨法。又有懸癰。亦生上腭。狀若紫葡萄。為肺三焦二經之病。亦發寒熱。至口不得開。舌不得伸縮。惟欲仰目。鼻出紅涕。乃肺三焦積熱所致。宜黃連消毒飲。外以犀角琥珀膏敷之。繆仲淳以為疑。即內疳瘡。恐屬二症。不得混視。大約內疳瘡稍輕。懸癰較重。總之人之口破。皆由于火。而火必有虛定之分。色淡色紅之別。虛火血色淡白。斑點細陷。露龜紋。脈虛不渴。此由思煩太甚。多醒少睡。虛火動而發也。宜四物湯加知柏丹。皮肉佳以為引導。是火色紅而滿口爛。

斑。甚者腮舌俱腫。脈寔口乾。此由飲酒厚味。心火妄動而發也。宜

膈散外敷。其餘若飲酒口糜。宜用螺若天行口瘡。宜五倍子末

苦年久口瘡。宜天冬麥冬元參若口疳臭爛。宜先以蛇床子湯漱

末等分津調餅子敷。若口角爛瘡。宜燕巢泥若鴛口白瘡。宜地雞

之少頃其瘡立消。若口角爛瘡。宜燕巢泥若鴛口白瘡。宜地雞

又名濕生虫。若吻上燕口瘡。宜筋頭若口舌爛瘡。胸膈疼痛。宜焦

研水塗之愈。若白口惡瘡。狀似木耳。不拘大小男女皆有。宜五倍子青

筒吹。若口齒氣臭。熏出人不可近。宜川芎白芷等分蜜丸含種種

雜病。皆當兼治者。尤氏口齒唇舌治法方藥詳載于咽喉門後閱

脈法。脈訣曰。左寸洪數。心熱口苦。右寸浮數。肺熱口辛。左關

弦數。胆虛口苦。倘若洪寔。肝熱口酸。右關沉寔。脾熱口甘。洪數

則口瘡或重舌木舌。回春曰。口舌生瘡。脈洪疾速。若見脈虛

中氣不足。

口舌生五味。得效曰心氣通于舌。能知五味。脾氣通于口。亦知五穀之味。又曰口之味熱勝則苦。寒勝則鹹。宿食則酸。煩躁則澁。虛則淡。勞鬱則臭。凝滯則生瘡。以口之津液通乎五臟。臟氣偏勝則味應于口。入門曰傷胃。陽虛則口中無味。傷腎陰虛則口中有味。醫鑑曰龍腦鷄蘇丸治胃熱口臭。肺熱喉腥。脾熱口甜。胆熱口苦。肝熱口酸。及胸中鬱熱等症大效。

口病原由症治。入門曰口臭者胃熱也。直指曰口臭一症乃熱氣蘊積胸膈之間。挾熱而衝發于口也。綱目曰小兒口瘡白礬或吳萸爲末。醋調塗腳心效。此小兒之難用藥者。又曰小兒口瘡黃柏青黛等分。冰片少許爲末。竹瀝調敷之。乳母宜服瀉心湯涼膈散。丹溪曰小兒口瘡巴豆肉一粒研爛。黃丹少許和捏作餅。外用紙護貼眉心。半刻許去之。立效。或以薄荷

自然汁。拭口內亦效。

口乾導引法 保生秘要曰。左右足心。每搓三十六回。按時吐納。津回。卽嚥六度。數週爲定。

運功 保生秘要曰。以舌捲上腭。凝元雍穴。貫一窟涼水。漸凝。

至口溪齒。

黃庭經曰。玉池清水。靈根註曰。玉池者。口也。清水者。津液也。靈根者。舌也。

齒者。腎之標。骨之本也。齒又爲手足陽明經所過。上齒。隸坤土。足陽明胃脈貫絡也。止而不動。喜寒惡熱。下齒。屬手陽明大腸脈絡也。嚼物動而不休。喜熱惡寒。故爲病不一。甚則動搖。齦斷。祖脫。作痛不已。虛則齒豁。枯焦而搖落矣。然而齒之爲病。大約有七。一爲風熱痛。由外風與內熱相搏。齒齦腫痛。有膿水流出。且臭穢是也。急以荊芥煎湯含漱。內服藥。宜犀角升麻湯二爲風冷痛。雖痛而齦不腫。亦不蛀。日漸動搖是也。宜溫風散并以開笑散含漱三爲熱痛。由腸胃間積熱。

故齦腫爛鼻穢。

宜涼膈散加酒大黃為君。知母石膏升麻為佐。噤咽效。

又內有濕熱被風冷

所鬱而作痛。

宜當歸龍薈丸。

又胃中有熱而痛喜冷惡熱。

宜清胃散。瀉胃湯。

又酒

家因酒熱常患牙痛。

宜以冷水頻頃含漱。

久年齒痛黑爛脫落必吸涼稍止。

乃膏梁濕熱之火所蒸也必下之。

宜調胃承氣湯加黃連。

此等是也。四為寒

痛由客寒犯腦故齒連頭而痛。

宜羌活附子湯細辛散。

此與厥逆頭痛暑同

當叅考。若寒熱俱痛者則為寒熱痛。

宜當歸龍胆散。

五為痰毒痛由素有

熱熱生痰痰流毒痰毒灌注經絡上攻牙齒而痛更兼痰盛咳嗽。

宜二陳加細辛枳殼烏姜連翹煎服再以姜黃煎服等分煎湯候溫以舌浸湯內涎自流。

六為瘀血痛由風熱

挾攻齦間令血出瘀滯故痛如針刺。

宜加減甘露飲加升麻或五靈脂醋煎含漱效。

若

齒痛齦數年不愈者亦當作陽明畜血治之。凡好飲者多致此疾。

宜桃仁承氣湯料細末蜜丸服之。

七為虫蝕痛由飲食餘滓積齒縫間腐臭之氣

淹漬致齒齦有孔虫生其間蝕一齒盡又蝕一齒至如疳墮必殺

虫而愈。

宜一笑散定痛散蜂窩散

古方書又有齒齲者。謂齒齲也。即齒虫蝕而

痛也。而此七者之外。又有牙齲紅腫面頰俱腫。頭面盡痛者。是熱

也。

宜升麻湯有牙齲腫痛。頭面不腫。或頭面腫。牙齲反不甚紅腫者。

皆虛火也。

上一症宜滋陰抑火湯下一症宜疏風散有本陽明受風。引烟熏之。煩熱反

致頰車連唇口多腫痛盛者。

宜犀角升麻湯有腎經虛而黑爛腫痛者。宜安

腎

有胃家寔火。上攻牙縫出血。

宜清胃散或胃虛火動。牙縫腐爛。以致

淡血常流不已者。

宜蘆薈丸有陰虧體質。被溫邪之氣上冲。齒

痛連頭顱者。

宜玉女煎有厥陰火鬱。而巔頂屬厥陰地位。因致上結核

齲腫痛者。

宜犀角羚羊角元參知母生草連翹黑山梔夏枯草金銀花

有因服熱藥。上下齒痛

不可忍。引腦痛。滿面熱。喜寒惡熱者。

宜清胃散有風痛者。遇風即痛。先

發浮腫。隨後作痛者。

宜消風散有虛氣攻牙痛。血出。或痒痛者。宜骨碎

切在熱火。此黑為末。擦牙吐咽俱可。且有風熱積壅。一切牙痛。

補二

并口氣者。宜紫金散有腫高而軟者。內必有膿。宜針刺膿出自愈有牙根腐爛。

出血不止者。宜犀角地黃湯外擦人中白散有牙宜露痛而出血者。宜乾絲瓜藤煨搽即止并

以地骨皮煎湯漱有齒縫中血滲出者。宜苦參一兩枯礬一錢研搽日三驗有牙根出血不

止者。宜含川芎多漚有出血不止甚至動搖者。宜白芷藜研末且且擦之有牙齒挺長

出一二分者。宜常咋生地妙有齒日長漸至難食。名髓益病者。宜白木煎湯漱服效

有牙根腫極痛。微赤有白泡。舌尖粉碎者。宜兒茶散吹之有疳腫牙齦臭

爛多膿。唇頰穿破不愈者。宜胆礬散及秘方有牙瘡。名附牙。由陽

明熱毒者。必先刺出惡血。後服藥。宜清胃散黃連消毒飲有牙瘡後頰車穴

閉口不能張。由體屬陰虛內熱。脉細數上出。其病在絡。藥餌一時

難效者。宜宜通絡痺方有骨槽風。又名穿腮毒者。由憂愁驚恐。悲傷思慮

所致。初起生耳下及頸項。隱隱皮膚之內。有小核。漸大如胡桃。牙

齦腫痛。寒熱大作。腐爛不已。日增紅腫。或左或右。或上或下。牙關

緊急不能進食。必用鵝翎探吐風痰。內速服藥。宜黃連解毒湯。方活命飲。加元參。

桔梗柴胡黃芩。忌刀針及點藥。如破傷入風。虛火上升。嘔吐血痰。臭穢不

食。必至不可救矣。有腎元虛乏。牙齦宜露動搖者。必當大補。宜八

還少。有小兒鑽牙疳者。牙根尖穿出牙根外。內芒刺。齦唇作痛。用

針挑破牙面好肉。以手取去本牙。出血不止。以濕紙貼換二三次。

其血自止。又戒厚味。牙可復生。宜犀角地黃湯。外以百藥煎五倍

日。搽二三次。神效。兼又小兒牙疳。并小兒口瘡。其色通白。及為風

疳蝕透。宜白姜。垂妙黃。拭去。垂上黃。他如齒癰。乃齦間長出努肉

也。由好食動風物之故。宜生地汁。一杯。皂角數片。炙熱。滓汁內。又

如聞齒乃被打傷動搖也。宜茯苓根。灰敷。又如齒折多年不生。宜

鼠脊骨。煨研末。又如齒齦乃睡中上下齒相摩有聲。由胃熱故也。

宜取本人口中。勿令知。即差。又如齒齦由多食酸之故。宜嚼胡桃肉。良。又如齒

黃其由積垢者勿論。大約脾腎二經之熱所致也。宜燒糯糠取白灰日日揩擦

以上種種皆齒所生病。不容忽視者也。

脈法 醫鑑曰右關脈洪數或弦而洪腸胃中有風熱而痛。尺脈洪大而虛者腎家虛主齒動疎豁相火上炎而痛。回春曰齒痛腎虛尺濡而大火炎尺洪疎落豁壞右寸關數或洪而弦此屬腸胃風熱多涎。

治 靈樞曰胃惡熱而喜清冷。大腸惡清冷而喜熱。入門曰胃絡脈入齒上縫其病喜寒飲而惡熱飲。大腸絡脈入齒下縫其病喜熱飲而惡寒飲。又曰熱牙痛怕冷水冷牙疼怕熱水不怕冷熱乃風牙痛。東垣曰胃有寔熱上齒痛尤甚。醫鑑曰上片牙痛亦屬腎經虛熱下片牙痛屬手陽明虛熱有風。又曰齒齲宜露動搖者腎元虛也。扁鵲曰病人唇腫

齒焦者死。脾腎絕也。又曰。病人齒忽變者。十三日死。少陰絕也。又曰。病人陰陽俱竭。其齒如熟小豆者死。

齒病修養法

養性書曰。齒宜朝暮叩以會神。一云。以集身神。

若卒遇凶惡。當叩左齒三十六。名曰打天鐘。若辟邪穢。叩右齒。名曰擊天磬。若存念至真。叩中央齒。名曰鳴天鼓。千金方曰。每晨起。以一捻鹽納口中。以溫水含揩齒。及叩齒百遍。爲之不絕。不過五日。齒卽牢密。類聚曰。凡人患齒不能食果菜者。皆齒露也。爲鹽湯含漱。叩齒神效。

上唇隸腎。下唇隸脾。兩腮牙根隸胃。唇病因火居多。但不可過用涼藥。必兼消散。所謂火鬱則發之也。其症有唇口腫動。或生核者。宜苡仁湯。有心脾受熱。唇舌燥裂。口破生瘡者。宜黃飲。若兼大渴引飲。則熱之極矣。宜和中清熱湯。有脾火盛而口唇生瘡。或多食易饑者。

藥湯有唇黃泡腫者。宜烏頭炒灰研。然此皆唇病之常耳。更有鹽

唇一症。又名緊唇。又名瀰唇。其狀口唇緊小。不能開合。不能飲食。

大是奇病。不急治。則死。而其症有爲腫爲寔之分。宜黃柏散白灰散。

良。此皆唇病之屬也。

唇病症治。丹溪曰。唇瘡久不差。八月藍葉搗取汁洗。不過一

二日愈。又白荷花瓣貼之。神效。如開裂出血者。卽止。繆仲淳

曰。唇腫黑痛痒不可忍。用四文大錢于石上磨猪脂塗之。不過

數遍。又曰。口唇緊小。不能開合飲食。不治殺人。作大炷艾安

刀斧上燒。令汗出。白布拭塗之。日五度。仍以青布燒灰酒服。又

曰。審唇緊裂。鼈甲及頭燒研敷之。一法。屠几垢燒存性香油或

猪脂調敷之。瘍科選粹曰。齒唇用五倍子二錢。蜜陀僧甘草

各少許。各爲細末。另用粗皮嫩黃柏一兩。將三末水調塗黃柏

上炙乾。又換以藥盡為度。將黃柏劈開片子。臨卧時貼唇上。天明即愈。一方以青皮燒灰敷之。

舌為心苗。舌本絡于脾口。故舌病多屬心。而其病之最重者。有六

一為木舌。由心脾熱壅。舌腫粗大。漸漸硬塞滿口。氣不得吐。如木

之不和軟者。然不急治。即塞殺人。宜黃連湯清熱如聖。散琥珀犀角膏外以針日破

八九次。令出血二三蓋。自然腫消痛減。蓋舌為心苗。心主血。故血

出而愈。再用藥敷之可也。宜龍腦破毒散五分。指蘸擦。又礪一為砂。未以生薑片蘸搗少時即消。

重舌。亦由心脾熱盛。舌根下生形如小舌。口不能聲。飲食不通。須

急服藥。先開關竅。宜如聖丹。再瀉心火。宜青黛散一外以針刺出惡

血。以竹瀝調黃柏末塗之。其有舌頰裡及上腭如此者。名曰重腭。

其着齒齦上如此者。名曰重齦。皆刺去惡血。內服藥。宜清一為舌

長舌短。舌吐長不能收。名曰陽強。口縮短不能言。名曰陰強。陽強

之症如仲景言傷寒熱病後犯房得病爲陰陽易舌出數寸而死。又如醫說言傷寒熱病後舌出寸餘累日不收必以片腦爲末搽舌上應手而縮須用五錢方效。又如入門言一婦因產子舌出不收醫以硃砂敷其舌令作產子狀兩女扶挾之乃于壁外擲瓦盆于地作聲聲聞而舌收是也。陰強之症如靈樞言足厥陰氣絕則舌卷而短厥陰者肝也肝主筋聚于陰器而絡于舌本故肝絕則舌卷囊縮又言舌者心之官心病者舌卷而短是也。一爲舌上生胎則由邪氣傳裏津液結搏之故若邪在表者舌無病也。方其邪初傳裏之時胸中之寒與丹田熱火相激則胎生而滑迨寒變爲熱則舌胎不滑而濇以熱耗津液滑者已乾也若熱聚于胃則舌胎便黃至熱已極則舌胎黑色黑爲腎色病已傳入少陰故靈樞曰熱病口乾舌黑者死入門曰凡舌黑俱係危症也若舌色淡黑

如淡墨一般。乃腎虛火炎為無根之火。與胎黑不同。一為舌生芒

刺。皆由熱結之故。或因心勞火盛而生瘡。宜犀角膏。或因脾熱而

舌胎乾澀如雪。宜冰。或因畜熱而舌燥澀如楊梅刺。宜厚片生姜。

消。或因熱結而舌生紅粟點。宜竹瀝調寒。一為自齧舌頭。靈樞曰。

自齧舌者。厥逆走上。脉氣皆至也。少陰氣至則齧。少陽氣至則

齧頰。陽明氣至則齧唇。据此則舌頰唇各從其所屬經氣逆而上

齧也。俱宜神聖。復氣湯。六者之外。又有舌心生瘡及破裂者。宜黃連。有舌

頭忽然腫硬如不血出如湧泉者。宜蒲。有不硬惟腫痛流血者。宜

血清脾飲。犀角地黃湯。有舌腫滿口不能出聲者。宜蒲。有舌卒腫大如猪肝

狀。滿口不治則殺人者。宜醋調釜底墨塗舌下。有舌腫咽痛咽生

息肉者。宜秤鍾燒紅淬。有舌下忽高腫起核名舌墊者。宜舌有舌

上無故出血者。宜犀角地黃湯。黃連瀉心湯。舌病之不一如此。夫安得不悉心

求治哉。再由舌病推之。有因呵欠。頰車蹉跌。但開不能合者。令飲大醉。俟睡熟。以皂角末搗鼻令嚏。即自正。或以南星爲末。姜汁調敷。以帛縛合。二宿當愈。有但合不能開者。速取鹽梅二個。取肉擦牙。即當口開。若既開又不能合。再用鹽梅擦兩牙。似能開合。即止。不擦。服去風藥。宜冰梅丸。薄荷蜜。如卒然牙關緊急。水不能入。亦同此治。又有頷骨脫離者。令伊坐穩。一人用手揉脰。一二百下。令伊口張。問一人用兩大拇指。入伊口內。拿定牙。外用兩指。將下頷往上兜。即入口正矣。此皆前人妙法。故叅取之。

脉法 脉訣曰。右關洪數。爲重舌木舌。回春曰。口舌生瘡。脉洪疾速。若見脉虛。中氣不足。

舌病症治 靈樞曰。足太陰氣絕。則唇反。唇反者死。唇者舌之本。唇反者。肉先死也。綱目曰。舌卷而短。若唇青。卵縮者必死。

肝絕故也。得效曰：舌本爛熱不止者逆。入門曰：舌胎白而滑，以生薑蘸蜜擦之。若黃赤燥澀，以新青布蘸水頻擦之。輕者易脫，重者難脫，必須大下之，津液還而胎自退矣。

補斷舌法 回春曰：舌頭被人咬去，先以乳香沒藥煎水噙口中，止痛後，即將水銀寒水石黑鉛輕粉硼砂研細抹上，即長全有效。入門曰：跌撲穿斷舌心，血出不止，以鵝翎蘸米醋頻拭斷處，其血即止，仍用蒲黃杏仁硼砂噙化而安。醫林曰：大人小兒偶含刀在口，割斷舌頭已垂，幸而未脫，急用鷄子白軟皮袋好，用破血丹，即花粉三兩赤芍二兩姜黃白芷各一兩研極細，蜜調塗舌根斷處，却以蜜調蠟稀稠得所，敷在鷄子皮上，蓋性軟能透藥性故也，當勤添敷，三日舌接住，方去鷄子皮，只用蜜蠟勤敷，七日全安。

治口病方三十三

冰柏丸

內熱 冰片一錢 川黃柏 薄荷葉 礪砂 各五分 蜜丸含化

赴筵散

臭爛 銅綠 白礬各一錢 為末摻舌上濕

赴筵散

細辛 黃芩 黃柏 黃連 山梔 乾姜 等分

四物湯

虛火 川芎 當歸 白芍 生地

龍腦鷄蘇丸

口臭

消風散

芎 荊芥 甘草各一錢 人參 茯苓 羌活 蟬壳各五分 陳皮 厚朴各三分 加細茶 或為末 每二錢茶下亦可

涼膈散

花粉 枳殼 赤芍 甘草 桔梗 黃芩 山查 口酸 柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

小柴胡湯

當歸龍薈丸

又 荊芥 當歸 龍胆草 蘆薈 甘草 黃芩 生地 赤芍 甘菊

面邪 口齒唇舌方

瀉心湯

口苦 黃連不拘多少為極細末每服二分半
或五分或一錢溫水下

龍胆瀉肝湯

又 柴胡一錢 黃芩七分 甘草 人參
黃連 天冬 龍胆草 山梔 麥冬 知母
各五分 五味子七粒 忌辛熱物

瀉黃散

口甘 山梔一錢半 藿香 甘草各一錢
石膏八分 防風六分

三黃湯

又 黃芩 黃連 山梔 石膏 赤芍 桔
梗 陳皮 茯苓各八分 白朮 甘草各三
分 烏梅一個

清胃湯

又

養胃進食湯

口淡

甘桔湯

口辛 甘草 桔梗

瀉白散

又 地骨皮 桑皮各一錢 甘草一錢 或
加知母貝母桔梗山梔麥冬生地亦可
內桂心五

滋腎丸

分 水泛丸湯下百粒

加減瀉白散

口腥 桑皮二錢 桔梗錢半 地骨皮 炙甘草各一錢 黃芩 麥冬各五分 五味子十五粒 知母七分 日二服忌酒麵辛熱物

加減甘露飲

口臭 熟地 生地 天冬 黃芩 枳壳 枇杷葉 茵陳草 金石斛 甘草各一兩 犀角三錢 每取末二錢水煎服 此方內犀角一味甚有道理有奇效

升麻黃連丸

又 青皮各五錢 生甘草三錢 白檀二錢 蒸餅丸彈子大每丸細嚼白湯下 升麻 姜汁

局方涼膈散

口糜 連翹二錢 大黃 芒硝 甘草各一錢 薄荷 黃芩 山梔各五分 加竹葉七片 蜜少許同煎至半入硝去渣服

移熱湯

又 生地 木通 甘草 竹葉 茯苓 猪苓 澤瀉 白木 等分煎服 此即導赤四苓二散合方也

柴胡地骨皮湯

又 柴胡 地骨皮各二錢半

回春涼膈散

又 連翹 錢二分 黃芩 黃連 山梔 枳壳 薄荷 當歸 生地 赤芍 甘草 梗 薄荷 當歸 生地 枳壳 赤芍 甘草

草各七分

理中湯

又

生肌散

上腭 木香二錢 黃丹 枯礬各五錢 輕粉錢半 共末 猪胆汁拌晒再研細 搽或吹 此方乃解毒去腐搜膿之劑 非竟自生肌也 蓋

十全大補湯

多骨 人參 茯苓 白朮 炙草 川芎 當歸 白芍 熟地 肉桂 黃芪 姜 棗

金匱腎氣丸

又 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤瀉 附子 肉桂 牛膝 車前子

補中益氣湯

又

取朽骨法

又 石胆 丹砂 雄黃 礬石 磁石 等 分用瓦盒收貯炭燒三日 夜啟開以鷄翎掃取 蓋上烟灰注瘡內則惡肉破骨盡出

黃連消毒飲

懸壺

琥珀犀角膏

又 琥珀 犀角 辰砂各一錢 茯神 人參 麥仁各二錢 為極細末另研水片二分 半煉蜜調膏每用彈子大一塊 麥冬濃煎湯化

下一日五服神效

治齒病方三十四

升麻石膏湯

升麻 石膏 防風 荊芥 歸尾
赤芍 連翹 桔梗 甘草 薄荷 黃芩
燈心 熱甚加酒大黃

滋陰抑火湯

當歸 生地 荊芥 防風 黃柏
知母 丹皮 甘草 燈心 白蒺藜 火甚
加丹參

疏風散

防風 荊芥 薄荷 黃芩 歸尾
赤芍 甘草 燈心 白蒺藜
胃熱 黃芩 黃連 丹皮 生地 升麻

清胃散

石膏 風熱 姜黃 細辛 白芷 為末擦牙須

姜黃散

風熱 姜黃 細辛 白芷 為末擦牙須

安腎丸

腎虛 菟容 白朮 山藥 桃仁 川烏
草薢 巴戟 石解 蒺藜 補骨脂 蜜丸

細辛散

風蛀 荆芥 細辛 各一錢 砂仁 鶴虱 各
五分 白芷 川椒 草烏 各二分 皂角 五
錢 草撥錢半 為末揩牙

蘆薈丸

胃火 蘆薈 銀柴胡 川連 胡黃連 元
參 牛蒡子 桔梗 山梔 石膏 薄荷

升麻 甘草 羚羊角

人中白散

又 人中白二錢 兒茶一錢 黃柏末 薄荷 青黛各六分 冰片二厘 漱淨口吹之 若走馬疳吹此藥涎從外出者吉入裏者凶

玉女煎

陰虧 熟地 麥冬 牛膝 知母 生石膏

紫金散

風熱 神效無比 大黃瓶內燒存性為末早晚搽牙漱去

黃連消毒飲

牙瘡

宣通絡痺方

又 羚羊角 白姜 川桂枝尖 煨明天麻 炒丹皮 黑山梔 鈎藤鈎

消風散

風痛 甘草 荆芥各一錢 人參 茯苓 川芎 姜蚕 防風 藿香 羌活 蟬退各五分 陳皮 厚朴各三分 細茶葉二分 煎服 或為末每二錢茶下

冰硼散

火痛

犀角地黃湯

犀角 生地 赤芍 山梔 丹皮 甘草 黃芩 燈心 口渴加麥冬

兒茶散

白泡 兒茶一味為末加冰片少許吹

胆礬散

牙痛 胡黃連五分 胆礬 兒茶各五厘

秘方

又 皂角用片瓦刮去外皮每二錢入鹽錢二

犀角升麻湯

犀角一錢半 升麻 羌活 防風各
一錢 川芎 白芷 甘草 黃芩 白附子
各五分 日二服

溫風散

又 本 當歸 川芎 細辛 白芷 華撥

開笑散

白芷 蜂房 細辛 良姜 華撥 川椒 香

涼膈散

山查 桔梗 黃芩 枳殼 甘草 荆芥 花粉

當歸龍薈丸

又 龍胆草 當歸 蘆薈 甘草 黃芩

瀉胃湯

又 當歸 川芎 赤芍 生地 黃連 丹
皮 山梔 防風 薄荷 荆芥 甘草各一
錢 或加石膏亦可

調胃承氣湯

又

羌活附子湯

寒濕 麻黃 附子 白芷 防風 炒姜 蚕
各一錢 黃柏 羌活 蒼朮各七分 黃芪
升麻 炙草各五分 水煎食後服

當歸龍胆散

各一錢 麻黃 升麻 龍胆草 黃連 草
各五分 生地 歸稍 白芷 羊脰骨 灰
為末擦

二陳湯

茯苓 陳皮 半夏 甘草

加減甘露飲

熟地 生地 天冬 黃芩 茵陳
枳殼 枇杷葉 金石斛 甘草各一兩 犀
角三錢 每末二錢煎服

桃仁承氣湯

一笑散

川椒為末 巴豆一粒 研成膏飯和
生丸 棉裹安蛙孔內即愈

定痛散

當歸 生地 細辛 乾姜 白芷 連
喬 苦參 川椒 黃連 桔梗 烏梅 甘
草各一錢 水煎噙漱後咽下

蜂窩散

蜂房一個 每孔內入胡椒川椒各一粒 用
碗盛之入水令滿加黃柏如指大三片于內以

礞蓋紙封固重湯煮二炷香取出候溫噙漱之
良久吐出

治唇病方五

苡仁湯

苡仁 漢防已 赤小豆 炙甘草各

竹葉石膏湯

竹葉 石膏 人參 半夏 炙草

瀉黃飲子

白芷 升麻 黃芩 枳殼 防風
金石斛各一錢 甘草五分

和中清熱湯

知母 黃柏 青黛 桔梗 甘草
生地 赤芍 花粉 丹皮 上唇腫生瘡氣
疔者加酒大黃氣虛者加酒川連 下唇腫生

黃柏散

齒唇 黃柏二兩 蜜陀僧 五倍子 甘草
各二錢 將後三味末塗柏上炙乾刮片貼唇

治舌病方十二

桃花散

延胡索一錢 黃連 黃柏各五分
蜜陀僧各三分 吹

黃連瀉心湯

黃連 甘草 生地 歸尾 赤
芍 木通 姜黃連 防風 荊芥

蒲黃散

蒲黃 海螵蛸 炒蒲黃各一錢 搽

涼血清脾飲

腫痛 生地 當歸 黃芩 白芍 連翹
防風 薄荷 石菖 甘草 傷酒加青黛
傷厚味加大黃枳壳山查 脾火加姜黃連

犀角地黃湯

又 犀角 生地 赤芍 山梔 丹皮 黃
芩 甘草 燈心 口渴加麥冬

舌墊方

舌墊 防風 荆芥 白芷 細辛 羌活
獨活 香附 陳皮 燈心

黃連湯

木舌 酒黃連 酒當歸 酒生地 山梔
麥冬 赤芍各一錢 犀角 薄荷 甘草各
五分 食後服

清熱如聖散

又 連翹錢半 惡寔 黃連各一錢 山梔
花粉各七分 枳壳 柴胡 薄荷 荆芥
各五分 甘草三分 燈心二圓 稍冷服

犀角琥珀膏

又 人參 杏仁 茯神各二錢 犀角 琥
珀 硃砂各一錢 冰片一分 蜜九彈子大
麥冬湯化日三五九

青黛散


重舌 黃連 黃柏各三錢 牙硝 青黛
硃砂各六分 雄黃 半黃 硼砂各三分
冰片一分 先以薄荷末抹口中再以藥搽
此方兼治咽喉腫

冰柏丸

舌胎 蜜丸彈子大含化 薄荷 珊瑚砂 等分 冰片減
此方兼治口舌生瘡粟

神聖復氣湯

三分另用酒黃連 酒黃柏 酒生地 枳殼各
川芎各三分另用新水浸 又取蔓荊子打碎 細辛
蒴各一錢 藁本 甘草各八分 半夏 升
麻各七分 當歸六分 郁李仁 人參 防
風各五分 炮姜 附子各三分 白葵花 三
朶去心打碎 水五大盞煎至二盞入黃芪
櫻草蔻仁各一錢 橘紅五分 同煎至一盞
乃入煎浸兩藥再煎至一大盞去渣空心熱服



咽喉音聲病源流

沈金鰲撰

咽喉症皆火病也。少陰少陽君相二火經脈並係咽喉。君火勢緩熱結爲痰爲腫。相火勢速腫則爲痺。痺甚則痰塞以死。火有虛實。寔火因過食煎炒蘊熱結毒。其症煩渴二便閉。風痰壅將發喉痺。先三日必胸膈不利。脈弦而數。必用重劑潤下去其積熱。大便下後方可用去風痰解熱毒之藥。清利上焦。若大便閉結不通難治。然壯盛者可用硝黃。微弱者但用滋燥潤腸之劑。再虛者止用蜜煎導之。虛火因過飲或善怒或好色。痰火上攻喉舌乾燥便澁。心脈虛數腎脈微。此水不勝火宜滋陰降火。不宜全用寒涼。取效一時致上熱未除中寒復起。毒氣乘虛入腹。胸前高腫上喘下泄。手足指甲青黑。七日後全不進食。口如魚口者不治。喉症最忌發汗。誤人不淺。或針砭出血。卽汗之之義。若寒傷于腎及中腫者尤忌。

用針。候針則不救。至如內傷虛損。咽喉失音。無法可療。喉症過四
五日爲重。三日前可消。若非急症。一二日不發寒熱。三日始發熱。
若頭痛。則兼傷寒。須疏風散寒。必問二便。便利者。乃浮游之火。上
攻。宜消風清熱。降氣解毒之劑。宜清喉症初發。一寒戰卽生者。發
後身涼。口不碎。又無重舌。或二便俱利。不可認作熱症。皆由陰氣
虛寒而發。其痰不可吊盡。以此痰卽身內精神所化。與舌後乳蛾
蟬舌之痰毒聚一處。必以流盡毒而愈者不同。若亦流盡。則精神
竭而必弊。先以吹藥。或用水渙之法。使喉一通。卽便服藥。第一劑
發散和解。宜清心利咽湯第二劑卽溫補資養以導火。宜酌用八味丸歸脾湯設三
四日後再發寒戰。或心痛脇痛骨疼難治。喉症發時。牙關緊。喉舌
腫。口碎腥臭。重舌。或舌有黃刺。便秘。卽是熱症。宜石膏散若症不減。
牙關反開。唇不腫。紋如無病人。不治。喉症舌腫滿。口色如葡萄。如

茄子如硃砂紙不治喉症最忌口渴氣喘痰如桃膠一頸皆腫面紅紫或青或純白無神不治喉症有寒傷于腎致喉花腫者關乎性命以喉花卽爲蒂中舌下紫筋爲舌繫下通于腎若白腫不治喉症無痰者不治有痰聲如曳鋸者危用吹藥出痰三次方可愈宜用金丹痰不出加製皂角少許倘喉碎先用長肉藥後用碧丹若至穿爛多用口疳藥加珍珠龍骨喉症其痛連胸而紅腫脉浮洪而數者係肺癰宜蜜調藥加枯梗百草霜喉中無形紅腫者熱也宜多用燈草灰喉症雖凶甚若發于外而不見死症治之必愈惟纏喉風及傷寒喉閉爲最重最險難治喉症凶者面發腫白亮無光彩脉沉微無力是神氣外洩無陽症也不治若面發紅腫脉洪大有力症雖極重是有元氣火氣治之可愈喉症腮口內腫爛用筋縛絲棉蘸水輕攪患處痛者用藥必愈若不知痛卽係死肉不治喉症切忌半夏生姜最喜梨與柿子婦人喉症腫痛先問經水有

因經閉而致火上升為患者。宜內服通經藥。經通而喉症自愈。宜

九經以上言喉病之大畧也。茲舉其症之可名者而條列之一。曰喉

痺。痺者。閉也。必腫甚。咽喉閉塞。為天氣不通。乃風痰鬱火熱毒相

攻之症。火有微盛。症因有輕重。其總絡係于肺胃。急清此二經之

熱。宜牛蒡湯外然雖屬火熱。內外表裏虛寒。不可不辨。如惡寒。寸

脉小。一時所患相同。屬天行邪氣。宜先表散。宜牛蒡湯大忌酸收。恐鬱

其邪于內。不得外散。其病之由來有二。一者少陽司天。三陽之氣。民

病喉痺。仲景用桔梗湯。依陽毒施治。一者太陰濕勝。火氣內鬱。民

病喉痺。又太陰在泉。濕淫所勝。病喉腫喉痺。或面青黑。仲景用半

夏桔梗甘草湯。依陰毒施治。若不惡寒。寸脉大滑寔。為陽盛陰虛。

下之則愈。宜酌用大亦可用膽礬等澀劑收之。外微而輕者。可緩

治。宜喉痺飲不可驟用寒涼。以痰寔結胸。遇寒不運。漸至喘塞不

治也。其有中氣急閉塞欲死者。此猶緩症。宜姜盞爲末姜汁調下立愈。或馬蘭根苗汁和
醋含漱立愈。或將鷲翎蘸馬蘭汁入喉。
探吐。拔去頑痰。自愈。痰盛飲汁亦妙。若甚而急。則用吹法吐法。
針法。吹法者。用礪砂膽礬末吹患處。或以皂角末吹鼻噴嚏亦開。
吐法者。用皂角揉水灌入。或新汲水磨雄黃灌入。卽吐。又一法。喉
病氣閉不通。死在須臾。卽用溫湯半碗入桐油三四匙攪勻。用硬
鷄鶩翎蘸探四五次。痰卽湧出。再探再吐。以人醒聲高爲度。後再
服藥。針法者。用硬針于腫處刺血。若口緊針不能入。則刺少商穴。
穴在大指甲內。左右皆刺二分。出血立愈。若長針急分開兩邊頭
去甲韭菜葉許。髮。捫住中間頭髮一把。盡力拔之。其喉自寬。此吹吐針三法。隨症
任用可也。又有陰虛陽氣飛越。痰結在上。脉浮大。重取或澁者。此
症最危。作寔症治必死。宜加減。其喉痺連項腫。宜芩連口緊者沙
方急告危症。一曰纏喉風。喉腫而大。連項腫痛。喉內有紅絲纏繫勢

如絞轉。且麻且痒。手指甲青。手心壯熱。痰氣壅盛如鋸。手足厥冷。或兩頤及項赤色纏繞。發寒熱亦是。皆由平日多怒之故。先兩日必胸膈氣滯。痰塞氣促。最為急症。過一日夜。目直視。牙噤。喉響如雷。燈火近口。即滅。此氣已離根。有升無降。不治。喘急額汗。不治。治法。不外喉痺。斟酌服藥。宜喉痺飲外用金碧二丹。頻吹藥內加牛黃更速效。若水漿不入。更危。宜解毒丸。一曰乳蛾。有單有雙。有連珠。單輕易治。雙重難治。連珠尤重。一日痛。二日紅。三日有形。會厭一邊腫。曰單。兩邊腫。曰雙。如白星上下相連。曰連珠。酒色過度。鬱火結成。治法亦不外喉痺。宜喉痺飲外用金碧二丹。一曰喉癰。肺熱也。喉間生紅絲如哥審紋。又致。鹽醬及助火等物。到喉則不救。癰步人多患此。宜喉痺飲青靈丹。吹碧。一曰喉菌。狀如浮萍。色紫生喉旁。蓋憂鬱氣滯。血熱使然。婦

人多患之。輕則半月，重則月餘。宜守戒忌口。宜獨飲不時含化。青靈膏吹藥初用碧

五金一後用一。曰喉癰。喉間紅腫而痛，無別形狀。由過食辛辣炙

煬火酒等物，熱極而發。症在胃大腸二經。重者寒熱頭疼，四五日

可愈。宜犀角地黃湯外用一。曰喉瘡。層層如疊，不痛。日久有瘻出。

臭氣，廢飲食。宜枸橘葉汁沖一。曰喉杵。喉極腫而極痛。宜甘桔射

燒鹽以上皆喉症之最鉅而有名可指者。其餘如曰咽嗑痛，不能

納氣與食，為地氣閉塞。凡病喉痺，必兼咽嗑痛。凡病咽嗑痛，却不

兼喉痺，由陰虛火炎也。宜喉痺飲倍。曰喉燥痛。水涸火炎，肺金受

剋故也。難治。忌辛熱收澁。宜養曰喉中腥臭。肺胃熱毒也。宜黃芩

曰喉中結塊，此危症。飲食不通。宜百靈丸重者不過兩丸。如曰穀

賊由穀芒強澁，藏于米而悞食之，滯于咽門，不能傳化，又為風熱

壅聚，與血氣搏，遂令刺肺，也不急治，亦能殺人。宜多取膏一。曰尸

咽由陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸虫發動上
蝕于喉或痒或疼如蠶之候也此與傷寒狐惑症同當參攷之以
上雖非如喉痺等症之鉅而可名要皆喉症之可數而不可忽者
也亦有伏氣病名腎傷寒謂非時暴寒伏毒于少陰始衰不病旬
日乃發脉微弱而咽痛次必下利當辛熱藥攻其本病順其陰陽
則水火降而咽疼自已又有少陽傷寒不傳太陽寒邪抑鬱內格
陽氣爲熱上行于咽門經會之處寒熱相搏而成喉痺用辛溫甘
苦以制其標病以通咽盛二者誤用寒涼多致不救此外又有咽
腫痰盛者宜清心利咽湯又有咽痛不腫者宜甘桔又有已汗下
餘腫不消者宜吹姜垂散又有久嗽喉痛者宜柿霜又有喉腫如丸者
宜龍腦又有喉中如有物不能吞吐者宜木香又有喉中食噎如
有物者宜含又有喉中痰涎壅盛者宜蘇子又有積飲停痰蘊熱

膈上至咽喉腫痛。胸膈不利。咳吐痰涎。舌乾口燥。無表裡症相兼

者。宜連又有走馬喉痺者。宜馬勃。焰硝各一兩。為末。每吹一字。吐涎血。即愈。又有風毒咽

腫。嚥水不下。及癰癰咽痛者。宜水服。黃若子。末二錢。神效。又有肺熱喉痛。有痰

熱者。宜甘草。鼠粘湯。又有熱病咽痛者。宜童便。含之。效。又有懸癰喉痛。風熱上搏

者。宜散。又有懸癰垂長。咽中煩悶者。宜枯礬。鹽花等分。研。筋頭頻點。在上。去涎。又有喉

中生肉者。宜棉。罌。筋。頭。挂。鹽。揩之。日五六度。又有脾肺虛熱。上攻咽喉。生瘡者。宜

門冬。又有喉痺已破。瘡口痛者。宜猪腦。蒸熱。人。姜。醋。吃之。愈。又有鎖喉蛇瘡。嶺

南人多受。朴蛇瘴氣。項大腫痛。連喉者。宜赤足蜈蚣。一二。節。研細。水下。愈。又有露

地之物。有天絲着上。食之。咽喉生瘡者。宜白礬。巴豆。燒。灰。吹入。即愈。又有咽喉

微覺腫痛。聲破難言者。宜桔。梗。湯。又有喉痛。因于相火。用涼藥不愈者。

宜六味九加桔梗。又有七情氣鬱。結成痰涎。隨氣積聚。堅大如塊。

元參。知母。黃柏。在心腹間。或塞咽喉。如梅核粉絮狀。咯不出。嚥不下。每發欲絕。逆

害飲食者。宜四七湯

又有風火上鬱咽痛頭脹或項腫當用辛涼

者。宜滑石連喬桑皮射干杏仁西瓜翠衣

又有腎液不收肝陽上越巔脹流涕咽喉

微痛者。宜六味丸加生地車前五味

以上零星喉症又各有治法如此而更有

總治一切喉中熱毒之方。宜清上丸總治一切喉中生瘡之方。宜牛黃湯

宜牛黃湯

治一切喉閉喉風痰涎壅塞口噤不開湯水難進之方。

宜金鎖匙

出如痰未出腫不消當刺少商穴

斯三者備喉症更無遺患矣要之咽喉者心肺

肝腎呼吸之門飲食音聲吐納之道關係一身害人迅速故曰走

馬看咽喉言不可遲悞也

脉法 正傳曰兩寸脉浮洪而溢者喉痺也脉微而伏者死

回春曰咽喉之脉兩寸洪溢上盛下虛脉忌微伏

咽喉之脉舌分別

靈樞曰咽喉者水穀之道也喉嚨氣之所

以上下也會厭者音聲之戶也懸雍者音聲之關也 得效曰

喉候氣咽咽物咽接三皖以通胃故以之嚥物喉通五臟以系肺故以之候氣氣候穀咽較然明白也 子和曰喉以納氣而通於天咽以納食而通於地會厭筦乎其上以司開合掩其喉則食下不掩之則其喉錯必舌抵上腭則會厭能開其喉矣四者交相爲用缺一則飲食廢而死矣 直指曰懸雍生于上腭雖不關于咽喉其暴腫亦熱氣也又曰懸雍謂之帝鐘其腫而垂下有長數寸者名帝鐘風宜用鹽礬散不可針破針則殺人入門曰懸雍者音聲之關若臟腑伏熱上冲咽喉則懸雍或長而腫。

咽喉病原由症治 內經曰一陰一陽結謂之喉痺痺與閉同入門曰一陰肝心包一陽胆三焦四經皆有相火火者痰之本痰者火之標也 正傳曰咽喉病輕重之異乃火之微甚故

也。得效曰。凡咽喉閉。毒氣歸心。胸前腫滿。氣煩促。下部洞泄。不止者死。

附錄九氏喉科秘傳

吾邑九氏爲喉科專家。世傳秘法。茲幸得之。故特附于此。

其書曰。喉症一二日腫痛。三四日勢定。有形。每至三日必發寒熱。或頭痛。刻刻吹藥。總不可緩。方有生机。喉痺者。總名屬風屬痰。屬熱。皆因火鬱而兼熱毒。致生乳蛾等症。大要去風痰。解熱毒。其症自愈。單乳蛾多因酒色鬱結而生。其症生喉旁。初起一日痛。二日紅腫。三日有形。如細白星。發寒熱者。四日勢定。大約四五日可愈。吹青藥五分。黃藥一分。後黃二青三同吹。出痰。兼服煎藥。宜喉症主方。俟大便走後。症自痊矣。如至三日。喉中但紅腫而無細白星。卽爲喉癰。宜辨。雙乳蛾。細白星左右俱有。藥照前用。左屬心。右屬肝。煎藥于主方內。左宜加黃連。犀角。

右宜加赤芍柴胡。雙蛾則兼用之。大便閉加枳壳元明粉。連珠蛾二白星上下相連。又或狀如纏袋。用藥照前。單蛾輕。雙蛾重。連珠更重。喉癰過食辛辣炙烤厚味醇酒。感熱而發。屬肺無形狀。止紅腫而痛重者。亦發寒熱頭痛。四五日可愈。用青藥加黃藥少許。內服藥。宜膠子蜜調藥喉症主方。喉癰爲虛火上炎。肺金太旺。致攻咽喉。生紅絲如哥窑紋。如秋海棠葉背後紋。飲食阻梗。咽痛雖不喪命。不能速愈。用青藥頻吹。不時噙膠子藥。再服主方。加土貝母。下氣須戒憂思怒憤酒色。忌一切鮮食物及動風動火之物。用藥醫治。一月可愈。若不守戒。不忌口。用藥遲延。必至症重難愈。久則聲啞而肺金受傷不治。喉菌屬憂鬱血熱氣滯。婦人多患之。狀如浮萍略高。面厚紫色。生喉旁。初起用青九黃一。後黃二青三。內服主方。不可間斷。亦難速效。輕則半月。

或二十日可愈。重則經月或月餘。治之得法可愈。亦須守戒忌口。蝨舌喉瘤。凡肥人感熱性躁者。多患此。煎藥犀角地黃湯加減。吹用黃藥。但此須吹至舌根下兩旁。時刻難間。方能速愈。喉內用青十黃一。亦須勤吹。凡舌下生如小舌樣者。爲蝨舌連喉腫痛。卽爲喉瘤。喉不痛者非瘤也。大抵蝨舌兼喉瘤而發者。十有六七。其勢凶。喉閉傷寒後發。難治。爲氣閉不通。無形無聲。纏喉風。口纏者。自頤纏擾赤色。寒熱心中躁急。而發先兩日。必胸膈氣緊。出氣短促。忽然咽喉腫痛。手足厥冷。頸如絞轉。熱結于內。腫擾于外。且麻且痒。喉內紅絲纏緊。手指甲白色。手心壯熱。喉腫而大。風痰壅盛如鋸是也。最爲急症。初起一日卽用藥頻吹。更服藥猶可治。若過一日夜。日直視喉中雷鳴者。不治。燈火近口卽吹滅者。不治。若喘急額汗。危在旦夕矣。倘下藥

俱加牛黃。已上諸症。十難一生。不可輕治。傷寒後患連珠蛾及
喉閉者。不治。其症喉項強硬。目睛上視。故多不治也。凡喉症
非急者。一二日未必發寒熱。症尚輕緩。至第三日必寒熱症必
加重。須審二便通閉。如通症亦可減。不過浮游之火上攻咽喉。
宜服消風清熱降火解毒藥。即愈。若二便閉。乃內有寔火。非用
降火解毒重劑。及通二便之藥。火何從洩。病何從解。頭痛。不痛。
亦要問。凡治喉症。必吹藥四五管。方可出痰。必出痰三四次。
可以全愈。初一管。必用黃藥多。爲要。宜對喉重口一吹。急提出。
管。恐痰即欲嘔出故也。餘俱輕口吹之。凡喉症先碎者。須先
用長肉藥吹之。後用青藥。凡出痰。不但黃藥多用。須單用青
藥吹入喉中。方能鉤出頑痰。初起一二日用青藥漸漸多加黃
藥。勢甚者。黃藥爲君。或單用青藥。凡喉症必大便去後方可。

望症。如閉結不可輕許其愈。凡喉症無痰者不治。喉閉多因
先患勞病重症。既久虛火上升。榮血已竭。喉之上腭有紅點。密
密如蚊虫咬斑。此係危篤將殞。斷不可治也。凡喉連胸紅腫。
此係肺癰之症。必用蜜調藥加百藥煎爲要。凡喉症初起。大
便閉。宜大黃元明粉下之。則火自降而易痊。若五六日後不食
而大便秘。用大黃元明粉反立斃。蓋以病後胃虛元氣已弱。故
禁用此二藥。雖閉甚。只宜用蜜導法。此秘訣也。凡吹藥不但
患處要吹。并四圍好肉上亦要吹。方不延開且易愈。凡吹喉
內藥。須用氣和平。用管周圍吹之爲妙。凡用青藥。看凶症。冰
片多于甘草。將愈甘草多于冰片。凡藥入瓶須捺寔。及用時
須將管發鬆。毋忽畧也。

青藥方

煉礬

牙硝

各三分

煨草灰

百草霜

礞砂

各五分

薄

煉礬法 明礬研細入傾銀罐內小半罐將礬入爐
用梓炭火煨以銅管針入罐底攪之無礬塊爲度
卽將礬細入礬內亦十分之三少頃再投入生礬末
白礬砂投入礬內亦十分之三少頃再投入生礬末
逐漸投完直待礬鋪出罐內高如鰻頭而止須加炭火
層至礬枯乾然後用瓦片一大塊覆罐上一時取起
將牛黃少許爲細末用水五六匙調和以匙起滴礬
內將礬仍入火內烘乾卽取起連罐覆合潔淨地上
地上用紙襯礬子罐上再用碗覆之過七日收貯須
煉礬至經鬆無堅紋者佳如堅定有堅紋卽不堪用
煨時火候初起宜緩亦不可太緩恐礬過定不易熔
化至有堅紋中後須用武火若礬末煨盡卽投硝礬
烘乾然後入爐不致炮碎亦不可放濕炭上烘使濕
透入礬經火亦必致炮碎矣
服燈草法 擇肥白燈草一把鋪淨桌上清水噴濕
候至燈草心內潮濕爲度將筆套一個要完固不碎兩
頭厚薄相勻用水濕管內以濕紅紙團塞緊一頭卽
將濕燈草捏入管內以竹箸打定傾去水塞滿後再
以濕紙團塞口入梓炭火煨之烟絕爲度取出放淨
磚地上須以水預先噴濕地上碗蓋之待冷割去筆
套及紙礬灰拆開燈草灰須黑水成團者佳服時勿
筆套炮碎礬灰則無用不可煨過過則灰無用又不可

面部

咽喉音聲

卷二十四 九

煨生則灰不成此藥最輕煨時極難得法須平日

冬製以備急用取百草霜法即銅底灰也燒茅柴者佳須取近鑊

面一層

配藥法配成即碧丹每煉礬三分加百草霜半匙

研細次入燈草灰一厘研勻如瓦灰色再入甘草末

三匙薄荷末二分研再入上好水片半分多加尤妙

研勻細入磁瓶紙塞緊口勿令出氣用時以烏金紙

包此藥須時配合若合過五日即不效五日內遇陰

雨亦無效也

不得草率

如吹喉症欲出痰加猪牙皂角末少許 惟喉癰及單乳蛾輕

症單用青藥即效若遇重症須兼黃藥用之若二藥兼用前後

多少最為要訣 凡初起用青藥九分配黃藥一分吹過五管

次用青八黃二再次用青七黃三如症重青黃對半用用至三

五次痰涎必不壅然後用黃六青四將管直對喉中重吹一次

立刻收管即吊出痰此要訣也若症重甚用黃八青二尤效

凡初起吹一次。須令患者低頭開口。溜出痰涎。凡遇春夏時

配藥。青藥多用薄荷。少用製礬。秋冬製礬多用薄荷。少用此要

訣。加礬砂少許。薄荷須二試者爲妙。其梗葉細。味辛涼。若頭試

梗葉大三試。味薄。俱不堪用。青藥驅風消痰。清熱解毒。真是

良方。然性尚緩。不及黃藥能消腫毒。除風熱。開喉閉。出痰涎。最

爲神效。然症初起。黃藥不可多用。因其能直透入內。且善走散。

若初起卽多用之。恐藥與病不相入也。喉症卽重。三日前尚

未成膿。藥能消散之。故尚無慮。至五日已成膿。必難消散。穿破

後。必爛成窠。爲難愈耳。爛處須用口疳藥。多加龍骨珍珠。

黃藥方
分 薄荷二分 硝九分 礬砂 冰片 薄荷葉各一

製硝法

馬牙硝長白厚大者。溫湯蘸過。棉帛捲乾。

仍用帛包好。放灶上。鹽罐洞內。五六日。自乾白如霜。

或用柴灰置飯甕內。以硝一大塊。放灰上。水淋過。留

盆內。一宿。硝自凝結。撈出。放熱灰上。收乾。仍用帛包。

面部

咽喉音聲

卷二十四

放鹽罐內倘未製就急切要用炒乾亦可生確
提過則朱淡而性平且合藥可以留入每確入雨水
四飯碗煎三碗取起入尖底凸口砂盆內將竹黃籃
片做品字樣竹竿放在盆內過一宿確自凝結于底
提起竹竿則稍自起此須十二月內製之為佳此又
一注也 姜蚕擇其細直而腹小者為雄可用粗而
腹大者為雌不可用也將牙刷蘸水刷去石灰瓦上
文火炙如醬色又要折斷中間無筋連者佳研細
猪牙皂牙取堅小不蛀者瓦上炙至色光明而脆為
度去兩頭研末 蒲黃生用用羅絹篩細黃末去粗
褐色者

口疳藥

配藥法配成即金丹 每牙確一錢蒲黃四分研細
次下姜蚕末一分牙皂末一分半共研極細如淡鷄
黃色如上好冰片一分研勻此藥可留久雖經年可
用惟冰片臨時加可耳 右藥姜能消腫出痰若遇
牙火蟻舌穿牙疳用此藥治之如咽喉等症則兼
用青藥看症輕重多少用之症重者再加牛黃如喉
附及握喉風加姜蚕牙皂餘只用牙確蒲黃可也
上好薄荷葉研細絹篩三分 兒茶末二分半製
黃柏末一厘 白龍骨末二厘 堅細白芷末如腫
痛用三四厘如不腫痛用二厘半 生甘草末用五
厘 珍珠細末五厘 共研極細加上好冰片三厘
再研勻入瓷瓶封固凡遇口碎及各種口疳用此治
之 若初腫起而熱甚者多加蒲黃及冰片取其辛

涼能發散也。若患不腫熱甚且病則宜以長肉為主。
用長肉藥

長肉藥

即前口疳藥多用兒茶末龍骨末配成紫色

凡治喉症碎者亦用此長肉藥。如治走馬牙疳穿牙毒。凡極重口疳初生小兒胎毒口疳本方加牛黃倍珠末無不奏效。若黑臭爛者不治。小兒黃色胎疳如乾橘囊者不治。如痧痘後口疳去黃柏龍骨加牛黃倍珠末大抵遇極凶症難效者或欲速愈見奇加牛黃五厘珠末六厘更妙。二味宜多加痘後疳非此不除。餘症加之則效如神。此係口疳藥秘訣。口疳重症藥內加上好滴乳石少許。上好珍珠少許。入兒茶內研極細。此亦秘訣。

製黃柏法 先用荆芥穗為君甘草為臣煎濃湯浸黃柏柔軟為度取起攤瓦上慢火炙至金黃色如焦色去之再以白蜜湯漉過一次晒乾聽用甘草須擇細小堅定者

膠子蜜調藥

薄荷葉末為君 煉礬為臣 燈草灰 川貝母二味為佐 甘草末三味

面部

咽喉音聲

卷二十四

上

為使 先將煉礬百草霜研和後入燈草灰再研後
入薄荷貝母研極細方入水片再研和配成青灰色
用白蜜調治喉癰喉菌須時時刻刻嚥咽若症重兼
服煎劑及用吹藥

喉症煎藥主方

牛蒡子炒研 前胡 連翹 金銀花 黑
山梔 甘草 桔梗 元參 枯梗
花粉 薄荷 加燈心三十段 泉水煎 如發寒熱
加小柴胡 頭痛加煨石膏 胸膈飽悶加枳壳
鬱熱而發加赤芍貝母 口渴加麥冬知母

玉液上清丸

蘇州薄荷葉十四兩 柿霜五兩 桔梗四兩
甘草三兩半 川芎二兩八錢 川百藥

煎五錢

防風兩六錢 砂仁四錢半 福建青黛

三錢

水片 元明粉 白礪砂各二錢 此吳陽

谷所傳方也研細末蜜丸芡寔大每服一丸不拘時

嚥化將治風痰上壅頭目不清咽喉腫痛口舌生瘡

眼之生津液化痰涎迺昔宋神宗患喉痺服此藥一丸

咽喉腫痛方

百草霜六錢 梅礬一兩 甘草三錢 片腦

不拘多少 此方兼治乳蛾牙疳等症 若治

纏喉風喉閉一切急症用梅礬一兩生甘草三錢兒

茶五錢雄黃二錢珍珠琥珀各六分自死蠶去頭

足炙脆為末麝香少許薄荷一兩又有時去雄黃加

蒲黃六錢

製梅砵法 取大青梅圓嫩而脆者先切下圓蓋好
好去核將白礬研細捺入梅內仍用圓蓋覆上以竹
釘封固過一夜明晨以炭火煨之梅不用其礬輕白
加薑粉味極平酸收貯瓷瓶聽用

通治咽喉口舌唇齒等症君臣佐使藥味別名

君藥四味

金丹合

玉丹製

碧丹合

王丹製

臣藥十味

澄玉有二用
另研 滴玉煨
歸 綠霜飛 元霜研

脆玉有二用
碎金研篩

軟玉全製 香玉
片金製 青霜研

佐藥十味

涼草研細
遊藥炙脆
地虫酒炙脆

苦草研細
天虫炙脆
香草研

甜草研細
紫玉研細

輕藥煨
赤土研

使藥十味

西金煨
或生研
細 福炒研

丑金研
酸果製

辰金煨
人霜煨

紅脆研
香脂研

圓明煨
象胆研

金丹

卽黃藥

玉丹

卽煉礬

碧丹

卽青藥

王丹

卽製黃

香玉

卽水片

輕藥

卽燈草

酸果

卽梅礬

辰金

卽龍骨

碎金

卽蒲黃

香草

卽白芷

紫玉

卽見茶

紅脆

卽琥珀

赤精

卽硃砂

登玉

卽明礬

天虫

卽姜蚕

甜草

卽甘草

香臍

卽麝香

青霜

卽青黛

軟玉

卽礪砂

地虫

卽蜣螂

脆玉

卽牙硝

澁藥

卽牙皂

元霜

卽百草霜

丑金

卽牛黃

片金

卽黃柏

圓明

卽珍珠

苦草

卽黃連

人霜

卽人中白

赤土

卽血竭

綠霜

卽銅綠

酉金

卽鷄內金

滴玉

卽乳石

象胆

卽蘆薈

涼草

卽薄荷

楸子

卽牛蒡子

以上皆喉科秘傳也。但其書總論云言咽喉則牙舌卽包羅于內。故口齒唇舌等症治相連而及。并其方藥有卽與喉科通者。余此書本各分門。然因尤氏之書雖舉不便採摘。分隸于各門之下。故姑取口牙唇舌等治法亦並錄于喉症之後。庶方藥可以類查。不至瑣碎難稽也。

其書曰：頸癰、胸前紅腫，形在外亦欲內攻，甚則喉腫而閉出。

膿外急以藥敷之。宜三黃散內吹青藥服煎劑。宜喉症主方面瘡與前

症相倣大抵屬鬱。托腮瘡生于腮下，因過飲醇酒多食厚味。

熱毒所結而生。治法如前。舌瘡舌紅而腫大，屬心經火盛，角

額亦紅腫。吹藥用青黃對半。須吹至舌根方愈。煎藥多加黃連。

山梔、犀角、木舌腫大如煮熟猪肝，不能轉動，生舌根下，狀

如白朮，有青紫筋，不能速愈，半月可痊。如初起不疼，不發寒熱，

漸漸腫大，初起愈遲，則愈難療。因憂鬱而發，內服煎藥。宜舌症主方

外用青藥加黃藥，初起青黃對半，後單用黃藥。舌菌屬心經

多因氣鬱而生，舌上如菌狀，或如木耳，其色紅紫。紫舌脹屬

心火，內必煩躁悶亂。吹藥單用青，內服藥。宜犀角地黃湯加減一二日可

愈也。懸癰生于上腭，有紫泡如豆大，用簪腳挑破，血出即愈。

或用口疳藥吹一次亦可。牙槽風初起先齒痛不已後牙根

肉浮腫紫黑色或出血久則腐爛而臭急用吹藥。宜用冰王方

珍珠然不能速效必至半月始愈初治五日紫色退至白色再至

五日可長肉再治五日方可望痊此症若久不愈甚則齒縫出

白膿謂之牙漏極難調治須戒酒色忌食一切辛辣炙煇內服

滋陰降火之劑。宜犀角地黃湯加減外用口疳吹藥方可漸愈甚則齒落

上月左邊第一門牙落者不治已上二經皆屬胃火腎虛內必

須服煎劑為妙。牙瘡其初起有小塊牙根肉上或上或下或

內或外其狀高硬即口疳藥吹之能消。牙菌生于牙根紫

黑色高起如崇用口疳藥治之此係火盛血熱而兼氣滯宜內

服煎劑。穿牙疔先二日牙痛發寒熱後痛不可忍牙根上發

一塊紫色用黃藥略加青藥治之內服涼血解毒降火消疔之

劑此症初起未破名穿牙疔。已破卽穿牙毒。一症兩名。穿牙毒。用口疳藥加牛黃。倍珠末。兒茶治之。內服煎劑。其色青者不治。紅者可治。牙。又生于牙根。又中齒不能開。牙關緊閉。用黃藥吹之。須吹到牙。又中。腫塊消散方止。此症初起。勢甚至夜。尤甚。然不難愈。亦不傷命。大凡患牙癰。牙根紅腫。但牙關不緊。口能開合。若患牙。又則牙根脹腫。而大牙關緊閉。口不能開。先用青黃二藥吹入牙根。外用黃連香削成鑿子樣。漸搗進牙門。則牙漸開。方可吹進黃藥。牙。搗屬胃火。如豆大。或內或外。先用黃藥。後用口疳藥。多加薄荷水片。煎藥內多加石膏連翹。牙。宜牙縫出血。上屬肝。下屬胃。寔火上攻故也。亦有胃虛火動腐爛牙根。以致淡血常常滲漏不已。內服清胃涼血之劑。外用珍珠散。又胃虛火動腐爛牙根。外用長肉藥吹之。內服扶脾清火之

劑。鵞口初生月內小兒滿口舌上生白屑如鵞口樣先用絲

棉捲箸水中蘸濕繳去舌上白翳用口疳藥吹之頻繳頻吹自

愈內亦須服藥

宜犀角丸或犀角汁或化毒丸

馬牙疳初生小兒胎內受熱

見風即生但看牙根上有白色如脆骨者即是先用溫水青絹

繳淨口內竹箸搥開牙根將銀簪腳淺淺挑碎出血繳淨吹口

疳藥立愈此症初發出胎即打噴嚏含乳不吮其病已深若不

急治入腹即死切勿誤作黃胆之類出胎便當看視日日要挑

至三四日病即成五六日堅硬難治甚有發而又發者大約百

日外可免此患小兒走馬牙疳及大人牙槽風俱要防齒落

上片左邊門牙爲牙中之主此牙落則餘牙盡落矣最重難治

若此牙不落餘牙雖落無妨凡治牙疳俱用黃藥多青藥少

倘有碎處先用長肉藥吹一管後用本藥吹之無虞凡治口

疳用絲棉輕攪切不可用青布恐布硬一觸患處以致疼痛也
凡唇上乾難吹藥者用蜜調敷上或用湯水濕其患處再用吹
藥凡患口舌等恙吹藥後舌上無涎乾如橘囊者不治凡遇口
舌腐爛無血出者不治

舌症主方

黃連 黑山梔 甘草 犀角 連翹 丹皮 生地
赤芍 麥冬 甘草 木通 如兼口唇必用煨

石膏為君以瀉脾火惟舌屬心故端瀉心火如有
鬱兼有積痰如貝母不拘咽喉口舌等症如大便秘
閉結加枳殼元明粉引用燈心凡病後忌用寒涼
恐妨大體

牙症主方

元參 丹皮 知母 甘草 白芍 地骨皮
山梔 黃柏 車前子 如熱甚加煨石膏為君

妙黑升麻為佐如解毒加黃連連翹如穿牙疔毒
熱地山梔如解毒加黃連連翹如穿牙疔毒
則用消腫解毒之藥加紫花地丁甘菊凡舌腫大
生蒲黃加冰片敷之舌出血用妙蒲黃凡舌腫大
癰大便秘煎藥內加大黃元明粉小便不利煎藥內
加六一散甚效此心法也

齒乃腎之標骨之餘足陽明胃脈貫絡于齒上根手
陽明大腸脈貫絡于齒下根屬腎熱有風寒亦有因
面部咽喉音聲

腎虛

一兒兩唇腫黑勢甚可畏服藥用連荷牛蒡子煨石膏黃連山梔生地丹皮花粉枳壳元參桔梗甘草木通如熱加薄荷前胡大便秘加元明粉一錢通即去之外用日疳吹藥多加薄荷水片

口疳喉內結毒吹藥

薄荷末一錢 兒茶八分 天靈蓋煨 珠末二分 甘草末

牛黃 一方加升丹紅粉霜 如廣瘡結毒加上好輕粉少

三黃散

生大黃 姜黃各二錢 生蒲黃五分 冰片五厘 麝香二厘 共為細末用白蜜調加葱姜汁二三匙敷患處或芭蕉根汁或扁柏汁和蜜調俱可

此方治頸瘰癧面瘡打腮瘰癧等症并治小兒丹毒兼敷陰症

人中白散

人中白製 雞內金 掛金燈子 青黛 鹿角 薄黃 薄荷 白芷 冰片 甘草 共為

末吹之 治牙又七日愈 治舌根瘰癧五日愈 治

愈 消腫用金王二丹碎用碧丹 治喉菌半月可

製人 中白法 取多年溺器一個用水灌放火爐上

滾則傾出如此三五次去盡穢氣然後益泥封固大火煨之半日取起冷定去泥壳取溺器內淡紅色者

置地上去火毒聽用

玉鑰匙

用巴豆壓滴于帛上取油昏燃成條子點火吹滅以烟熏入鼻中一時口鼻流涎牙關自開此方端治牙關緊閉

黃袍散

薄荷葉一兩 黃柏 甘草各三錢 黃連二錢 冰片不拘多少

此方端治一切口疳口瘡口碎走馬胎疳痧痘後疳口糜口腐等症

藍袍散

銅青水飛淨 生甘草各二錢 白芷一錢 硼砂二錢 綠子去蛀打碎炒黑研末二錢

冰王散

冰片八分 人中白 黃柏 蒲黃各一錢 薄荷葉 黃連各錢半 甘草 青黛 硼砂 朴硝各五分 枯礬少許 共為末內吹外敷俱妙 兼治丹毒

犀角丸

犀角 粉草 朴硝各二錢 桔梗一兩 赤苓 生地 連喬 新牛蒡子 元參各五錢 青黛一錢 蜜丸龍眼大每一丸薄荷湯下 兼驚則硃砂

為衣 此方端治小兒走馬牙疳 通治小兒諸瘡及痧痘後餘毒並效

十寶丹

梅礬 薄荷 兒茶各一兩 甘草五錢 乳石三錢 血竭 珍珠 琥珀各二錢 冰片三分 此

面部

咽喉音聲

卷三十四

附錄楊氏咽喉十八症名目及咽喉看法

喉痺 纏喉風 單乳蛾其形圓如箸頭生喉中左右若生下

關不能見者難治宜羅青散又方不論單雙蛾用牡蠣粉四匙

平腫甚效雙乳蛾兩個生喉間關下是也難治宜羅青散消毒散蟬舌

風舌下再生一舌也牙蟬風牙根腫甚聚毒成瘡是也木

舌風舌黃風舌上黃色腫痛魚口風如魚吸水是也不治

懸蟬垂壽風上腮腫湯水難入形腫如雞卵搶食風亦名

飛絲毒生口中或食鯉鱈惡物發泡是也撒煩風腮類結腫

牙盡處腫破喉風風自頤纏繞赤色寒熱松子風口內滿

喉間赤紫如猪肝張口吐物則氣逆閉閉飲食不入崩砂疳

口風自舌下牙根上赤腫口內作瘡如湯之熱牙根漸爛齒牙

漸脫。連珠風自舌起。初起一个。又起一个。甚者三、五、七、九个。連珠生起。蜂子毒或在臉腮。洋爛或在喉。開舌下作。唇色黃如蜂。走注。癰癰風。頸項結核。五、七、个。皮膚赤腫。作寒熱。

咽喉看法。初起。紅色腫痛。語聲清朗。無表裡症。相兼者輕。

如已成腫痛。咽喉半開半閉。咯吐痰涎。飲食稍進者。順。咽喉

腫閉。牙閉緊急。言語不清。痰壅氣急。聲小者。險。咽喉驟閉。痰

涎壅塞。口噤不開。採吐不出。聲喘者。死。生瘡之後。毒結喉間。

腫痛腐爛。吐納不堪。聲啞者。重。久嗽痰火。虛陽攻上。咳傷咽

痛。但見聲嘶。面紅者。死。

音聲病。肺家火熱症也。蓋聲啞者。莫不由于肺熱。宜降氣清熱潤

肺生津涼血益血。宜。醫金生。地。蒲。黃。朱。根。聲重者。莫不由于肺熱。

痰稠。宜用前藥加。暴瘡者。莫不由于火盛。宜降氣發音聲。宜。蘇。子。貝。母。桔。荷。竹。瀝。

梗枇杷葉百部竹瀝天冬麥冬亦有寒包熱而聲啞者宜薛金亦有

梨汁甘草薄荷元參桑皮童便宜防已姜蚕木通菖蒲竹瀝

風毒入肺而失音或痰迷而舌強者山鉅南星半夏荆芥陳皮

亦有喉音如故但舌本不能轉運言語由于體虛有痰者宜補虛湯亦

有中風病而舌強舌卷不能言者宜大秦花湯苦天亦有勞嗽失

音但喉聲不清者宜子湯亦有痰結喉中語不出者宜玉粉丸亦有久嗽

失音者宜蛤蚧丸亦有暴嗽失音者宜杏仁桑皮湯亦有初感風邪驟用參芪

五味而喉啞者宜細辛半夏生姜倘邪去仍嗽肺管開也宜五味烏梅大

抵搥治喉音啞久嗽聲啞須用清滋之品宜清音湯

音聲原由症治 直指曰肺為聲音之門心為聲音之主腎為

聲音之根風寒暑濕氣血痰熱邪氣干于心肺者病在上脘隨

症解之邪散則天籟鳴矣若腎虛不能納氣歸元致氣逆而上

咳嗽痰壅或喘或脹胸腹百骸俱為牽制嗽益重氣益乏聲益

咳嗽痰壅或喘或脹胸腹百骸俱為牽制嗽益重氣益乏聲益

咳嗽痰壅或喘或脹胸腹百骸俱為牽制嗽益重氣益乏聲益

乾矣

以上言腎音出于腎

錢仲陽曰大病後及虛勞病雖有聲而不能

言又能進藥此非失音乃腎怯不能上接于陽故也當補腎失

音乃感風寒而卒病耳

以上言腎怯與失音相似

內經曰中盛藏滿氣勝

傷恐者聲如從室中言是中氣之濕也靈樞曰病人語聲寂

寂然善驚呼者骨節間病語聲喑喑然不徹者心膈間病語聲

啾啾然細而長者頭中病回春曰肝病聲悲肺病聲促心病

聲脾病聲慢腎病聲沉大腸病聲長小腸病聲短胃家聲速

胆病聲清膀胱病聲微東垣曰濕勝則聲音如甕中出矣以

言聽音辨症

靈樞曰寒氣客于會厭則厭不能發發不能下故無

音也得效曰醉卧當風使人卒失音丹溪曰風冷能令人

卒失音

以上言卒然無音

綱目曰瘖者邪入陰分也然有二症一日

舌瘖乃中風舌不轉運之類是也一日喉瘖乃勞嗽失音之類

是也。蓋舌瘡。但舌本不能轉運言語。而喉咽音聲則如故也。喉瘡。但喉中聲嘶。而舌本能轉運言語也。以上言瘡。得效曰五臟久咳則聲嘶。嘶者。喉破也。非咽門病。入門曰用力顫掉聲嘶。乃氣虛衛冷甚也。丹溪曰。咳嗽聲嘶。乃血虛受熱之故也。
以上言聲嘶。內經曰。不得卧而息有音者。是陽明之逆也。足三陽本下行。今逆而上行。故息有音也。陽明者。胃脉也。陽明逆不得從其道。故不得卧也。夫起居如故。而息有音者。此肺之絡脉逆也。絡脉之病人也。微。故起居如故。而息有音。以上言息有音。扁鵲曰。病人五臟已奪。神明不守。聲嘶者死。入門曰。內傷虛損。因瘡失音者。不治。病人陰陽俱絕。失音不能言者。三日半死矣。以上言失音。
治症

喉痺飲

摠治 桔梗 元參 貝母 荆芥 薄荷
姜蚕 前胡 甘草 花粉 燈心 牛蒡子
款冬花

清心利咽湯

痰盛 黃連 黃芩 防風 荆芥 薄荷
桔梗 山梔 連翹 元參 大黃 朴硝
甘草 牛蒡子

吹藥方

又 火硝 錢半 硼砂 五分 姜蚕 二分半
冰片 二厘

八味丸

又 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤
瀉 附子 肉桂

歸脾湯

又

石膏敗毒散 熱症

通經丸

經閉 桂心 青皮 大黃 姜炭 蓬朮
乾漆 當歸 桃仁 延胡索

牛蒡湯

喉痺 升麻 牛蒡子 黃藥子 元參 紫
背浮萍 桔梗 甘草 天花粉 外用通監
散吹之

通監散

又石各一分 礪砂二分 兒茶 青黛 滑石 寒水
分 冰片二厘 黃連 黃柏 蒲黃 枯礬各半

大承氣湯

陽盛 大黃 芒硝 厚朴 枳實

芩連消毒飲

項腫 柴胡 羌活 黃芩 黃連 防風
荆芥 白芷 川芎 連翹 桔梗 枳殼
射干 大黃 甘草 牛蒡子 等分 惟桔梗
加倍

急救方

喉中痰自開 馬蘭梗葉打汁入醋少許滴鼻中或灌

解毒雄黃丸

喉風 雄黃 鬱金各一兩 巴豆十四粒
醋糊丸菜豆大醋磨下七丸吐痰即愈不吐再
服或就腫處刺血以牙硝吹點之或刺手大指
之少商穴

青靈膏

喉癰 薄荷三錢 貝母一錢 百草霜 甘
草各六分 冰片三分 玉丹二錢 元丹八
分 共研細蜜丸噙化

犀角地黃湯

喉癰 犀角 生地 赤芍 山梔 丹皮
甘草 黃芩 燈心 口渴加麥冬

甘桔射干湯

喉忤 桔梗二錢 山豆根 甘草 射干
連翹 防風 荆芥 元參 牛蒡子各一錢

二分 竹葉十片

養金湯

生地 阿膠 杏仁 知母 沙參

百靈丸

百草霜 蜜丸 大新汲水化服

元參解毒湯

元參 山梔 黃芩 甘草 葛根

柿霜丸

柿霜 硼砂 天冬 麥冬 各二錢

木香四七丸

木香 五分 射干 樨榔 羚羊角

犀角 陳皮 厚朴 半夏 各一錢 赤苓 二

六味丸

地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓

喻化龍腦丸

冰片 射干 各二分半 鍾乳粉 升

牙硝 黃芪 各一錢 大黃 甘草 各五

含化丸

杏仁 五錢 枇杷葉 官桂 人參 各

四七湯

蘇葉 半夏 厚朴 赤茯苓 陳

面部

咽喉音聲方

卷二十四

皮七分 蔻仁六分 檳榔 益智仁各三分

蘇子降氣湯

蘇子 厚朴 半夏 陳皮 前胡 官桂各一錢 甘草五分

連喬散

痰核 連喬 葛根 赤芍 黃芩 山梔 桔梗 麥冬 甘草 木通 牛蒡子

少陰甘桔湯

咽痛 甘草 桔梗 川芎 陳皮 柴胡 元參 羌活 升麻

清上丸

分 熊胆一分 雄黃 薄荷 青鹽各五 痰盛 礞砂一錢 膽礞少許 蜜丸壓舌下化

殭蚕散

妙研生礞研等分 白梅肉 九皂子 大棉裹含化 燕汁良

甘艸鼠粘湯

肺熱 鼠粘根二兩 每末二錢 水鍾半入阿膠 此方治急喉閉神效 桔梗 米泔浸一夜炒一

啟閉散

懸壺 炒惡寔 生甘草 等分水煎含嚥

麥門冬丸

寔熱 麥冬一兩 黃連五錢 蜜丸每二十 九麥冬湯下

金鎖匙

冰片一分 火硝錢半 雄黃二錢 礞砂五錢 姜蚕一錢 共研末吹之痰自出

如腫不消刺少商穴

羅青散

乳鐵 蒲黃五分 羅青 盆硝各三分 甘草一分 冷蜜水調細燕如吞不下以鷺翎蘸藥掃入喉內

金丹

總治 給硝錢八分 生蒲黃四分 姜蚕一錢 牙皂分半 冰片一分 研細吹此方能消腫去痰

碧丹

又 玉丹三分 元丹一厘 百草霜半匙 甘草炭三匙 冰片五厘 薄荷去筋二分 牙皂少許 凡喉痺初起金丹不宜多用以其性善走功能達內症輕則不勝藥力也 此碧丹消痰清熱祛風解毒開喉痺出痰涎最效不比金丹之匹利 凡喉痺單蛾輕症止用碧丹重症金碧合用初起碧九金一吹過五管後碧七金三極重金碧各半吹進上壅金六碧四因症之輕重以定藥之多寡最宜斟酌無痰切莫亂用 又 即前尤氏方內之煉礬也

玉丹

元丹

又 即前尤氏方內之煨煨草灰也

雪梅丹

又 即前尤氏方內之製梅礬也

配合吹藥

又 碧丹二分 元丹一厘 百草霜五厘
甘肅冰片各一分 薄荷末二分 牙硝研三分 礪砂五厘

治音聲病方八

鬱金湯

子 杏仁 鬱金 生地 知母 阿膠 牛蒡
黃芪 童便 桔梗 沙參 陳皮各一錢

補虛湯

黃芪 白朮 當歸 陳皮各一錢
姜汁各半盞

大秦芫湯

白芷 茯苓 細辛 熟地 生地
秦芫 羌活 獨活 防風 黃芩 白朮
石膏 甘草 川芎 當歸

訶子湯

音濁 訶子二個 炙一 桔梗五錢 牛炒
半生 甘草二錢 炙半生 童便水各半盞
煎三服愈

玉粉丸

牛夏五錢 草烏炮二錢半 肉桂一
姜汁糊丸 每夜含化一丸

杏仁桑皮湯

砂糖各一兩 五味子 紫苑各二錢 通
杏仁一兩 桑皮五錢 姜汁 白蜜

草 貝母各四錢

蛤蚧丸

人參 蛤蚧一對 去口足溫水浸去膜刮了血
脈酥炙 訶子 阿膠 生地 麥冬 炙甘草
草 細辛各五錢 蜜丸含化

清音湯

總治 訶子肉 阿膠 天冬 鹽知母各五錢
蜜炙黃柏 麥冬 茯苓 歸身 生地
熟地各一錢 人參三分 烏梅二個 人
乳 牛乳 梨汁各一盞 蜜丸每一錢含化

